

# 园林病虫害信息

第三期（总第 470 期）

天津市市容和园林管理委员会  
天津市园林绿化研究所植保中心

2016 年 03 月 21 日  
植保热线：84268088



## 草履蚧

据近日调查，草履蚧若虫大量出蛰，所查墙体、直立物、树体上均能见到若虫爬动，爬上树体的若虫已开始刺吸危害，虫体膨大，部分虫体已分泌蜡粉布满身体。若虫多栖息在树杈和芽枝的基部幼嫩部位，也有部分若虫在花基部和萼片上。据在多个区调查，该虫发生植株、数量较多，若虫已上树的株数也较多，如不抓紧防治，将会造成严重危害。此期防治以药剂为主，喷洒 1.2% 苦烟乳油或 1% 苦参碱 1000 倍液或蚧螨灵 80-100 倍液，对正值花期的植株应喷洒枝干杀灭若虫，待落花后再全面喷洒防治，免于影响观赏花景。再者要积极做好墙体、直立物等处的若虫清扫清除，然后再喷药补漏，切断其扩散路径。望各养管单位和群众单位抓紧时间进行防治。



草履蚧若虫上树



桃蚜孵化危害



桑白盾蚧雌成虫

## 蚜虫

据近期调查，桃蚜、桃粉蚜陆续孵化为若虫，新孵化的若蚜多聚集于枝条、芽的基部、花朵的花萼上及嫩枝梢处开始刺吸危害。有的植株若蚜孵化数量已较多，应抓紧时机尽早防治。当前可进行药剂防治，应选用 1.2% 苦烟乳油或 1% 苦参碱 1000 倍液，仔细喷洒杀灭若虫，对有花的植株落花后立即展开喷药防治，连续防治，效果更佳。



杨树溃疡病斑

## 美国白蛾

据近期调查，未见美国白蛾越冬蛹羽化成虫，各养管单位仍应坚持挖蛹防治。



桃树流胶

### 沙里院褐球蚧、桃球蚧

该两种蚧虫以若虫越冬，此期已活动危害，虫体开始膨大，并产生白色蜡粉覆于体表，应注意检查防治。防治此虫可用蚧螨灵 80-100 倍液、1.2%苦烟乳油或 1%苦参碱 800-1000 倍液，主要喷洒部位是枝条和芽基部。

### 桑白盾蚧

据近日调查，桑白盾蚧越冬雌成虫尚未产卵，但虫体颜色鲜艳，已膨大，开始活动。此期最适宜人工刮除虫体，减少雌成虫数量，还可喷洒 300 倍液晶体石硫合剂进行对靶防治，注意不要伤及嫩枝芽及花。

### 其它害虫防治

此期应注意防治的害虫还有斑衣蜡蝉越冬卵块(应全部在若虫孵化前刮除完毕)；桑刺尺蛾、春尺蛾（成虫羽化时进行人工捕杀）；玫瑰茎蜂（月季修剪时注意剪除有虫枝）；光肩星天牛、六星黑点豹蠹蛾、小线角木蠹蛾（剪除有虫枝）；国槐小卷蛾（剪除槐豆荚、有虫枝）；草坪红蜘蛛（喷洒 1.8%阿维菌素 6000 倍液杀灭，药液应达草根基部位）。

### 白粉病

我市黄杨白粉病、紫叶小檗白粉病、法桐白粉病、花灌木和果树白粉病多有发生，尤其是黄杨白粉病发生严重，且染病数量大，此期可对尚未发芽和芽萌动期的植株喷洒 100 倍液晶体石硫合剂，芽萌动后应改喷 300 倍液防治。

### 杨树腐烂病、溃疡病

据本次调查，一些杨树已开始出现溃疡病斑、腐烂病斑并已开始扩展危害，可采用刷涂 30 倍液晶体石硫合剂或 10 倍液梳理剂进行防治。

### 其它病害

对其它植物上发生的溃疡病、腐烂病、枯萎病、枝枯病、流胶病等均可采用梳理剂 30 倍液刷涂进行防治。