

# 园林病虫害信息

第五期（总第 472 期）

天津市市容和园林管理委员会  
天津市园林绿化研究所植保中心

2016 年 04 月 06 日  
植保热线：84268088



## 美国白蛾

据本次调查，仍未见美国白蛾越冬蛹羽化成虫，据例年的调查记载，我市越冬代美国白蛾蛹最早在 4 月上旬羽化，羽化盛期在 4 月下旬、五月上旬，各有关单位应开始巡回检查，发现成虫羽化及时防治。



桑刺尺蛾初孵幼虫

## 梨星毛虫

据近日调查，梨星毛虫幼虫虫体长近 6mm 左右，在卷叶中啃食叶肉危害，当前正是西府海棠盛花期，打药无益于赏花，待落花后及时喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液防治。也可于花期人工摘除有虫叶苞，杀灭幼虫，不影响花期赏花。



梨星毛虫幼虫

## 桑刺尺蛾

据近日调查，桑刺尺蛾初孵幼虫食害叶片，该虫主要危害金叶女贞、海棠、金银木、白蜡、槐、杨、柳、桑、月季等多种园林植物。幼虫数量大时可造成叶片被吃光现象，目前虫体很小，应喷洒 1.2%苦烟乳油 1000 倍液、1%苦参碱 1000 倍液尽早杀灭。



沙里院褐球蚧

## 双齿绿刺蛾

据近日调查，双齿绿刺蛾越冬茧仍处在蛹期，该虫成虫将于 5 月末、6 月上旬羽化，当前仍应进行人工敲茧杀虫，以减少成虫羽化数量。



榆秋四脉绵蚜

## 草履蚧

据近日调查，草履蚧若虫明显增大，大部分已进入第一次蜕皮，虫体多集中在枝条分杈及芽基部危害，当前可喷洒 1.2%苦烟乳油 1000 倍液、5%吡虫啉乳油 2000 倍液、蚧螨灵 100 倍液杀灭。虫体数量大且较集中的部位亦应进行人工刮除防治。



麦岩螨

### 沙里院褐球蚧

据近日调查，沙里院褐球蚧越冬若虫均已出蛰活动危害，虫体逐渐膨大，并分泌蜡粉于体背，少部分较大虫体已开始排泄蜜露，污染枝条和环境，可喷洒蚧螨灵或吡虫啉进行防治，亦可人工刮除虫体杀灭。

### 蚜虫

据近期调查，我市多种蚜虫发生，有桃蚜、桃粉蚜、桃瘤蚜、榆秋四脉绵蚜、栾多态毛蚜、枫多态毛蚜、毛白杨蚜、绣线菊蚜、金银木蚜等，防治蚜虫应喷洒1.2%苦烟乳油1000倍液、1%苦参碱1000倍液，对在卷叶中危害的蚜虫喷洒5%吡虫啉乳油2000倍液防治，对当前正在开花的植物待落花后需加紧防治。

### 山楂叶螨

据本次调查，山楂叶螨在树体上增多，但单个叶片上数量较少，亦未见其产卵，当前可喷洒1.8%阿维菌素6000-8000倍液杀灭。此期亦应注意金银木红蜘蛛的危害。

### 草坪红蜘蛛（麦岩螨）

据近日调查，我市个别地块发生草坪红蜘蛛数量较大，该螨开始扩散，有的爬向草坪中的植物，数量较大，可喷洒阿维菌素杀灭，该螨一旦惊动即坠落下面，为此喷药应着重草坪地面部位。

### 光肩星天牛

据近日调查，光肩星天牛幼虫均已活动危害，从排粪孔中排出较多的木屑。此期应开始人工注射药剂防治，药剂应选用1.2%苦烟乳油100倍液。

### 小线角木蠹蛾

据本次调查，小线角木蠹蛾越冬幼虫均已活动危害，从排粪孔中排出较细碎的木屑，亦有流水现象，该虫主要危害白蜡，速生白蜡受害也重，还可危害国槐、西府海棠等。据近日调查，在西府海棠上危害日趋严重，并可造成枝条死亡、树冠不整，甚至整株死亡，为此应着重检查防治。当前应进行药剂注射杀灭幼虫，药剂应选用1.2%苦烟乳油100倍液。

### 其它病虫害

当前还应注意防治春尺蛾、天幕毛虫、六星黑点豹蠹蛾、臭椿沟眶象、白粉病、溃疡病、腐烂病等。