

# 园林病虫害信息

第七期（总第 474 期）

天津市市容和园林管理委员会  
天津市园林绿化研究所植保中心

2016 年 04 月 18 日  
植保热线：84268088



## 美国白蛾

据本次多点调查，仍未查到美国白蛾成虫羽化。据历年成虫羽化调查记录，最早可于 4 月上旬末见到成虫，多数年份在 4 月中旬首见成虫羽化，因此预计近日可见到成虫羽化，各养管单位近期须加强调查，一旦查到成虫羽化即进行人工或药剂防治。另：于今日试验室内剖蛹已查到部分蛹已发育为成虫，即将破蛹羽化。



白蛾成虫羽化 (雄)



梨星毛虫苞叶及幼虫

## 梨星毛虫

据近期调查，危害西府海棠、杜梨等植物的梨星毛虫幼虫虫体明显增大，树冠打苞叶片数量明显增多，幼虫虫体长 1 厘米左右，此时可进行人工摘虫苞杀死幼虫或喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液防治。

## 春尺蛾



春尺蛾幼虫

据本周初调查，春尺蛾幼虫体长已达 1-2 厘米，取食叶片量逐渐加大，当前应及时喷洒 1.2%苦烟乳油或 1%苦参碱 1000 倍液杀灭。



榆秋四脉绵蚜

## 其它食叶害虫

近期应注意防治食叶害虫还有桑刺尺蛾、柳毒蛾、杨扇舟蛾、天幕毛虫、国槐尺蛾（成虫）、国槐小卷蛾、榆绿叶甲、枸杞负泥虫等，均可采用苦烟乳油和苦参碱进行防治。



桃球蚧

## 草履蚧

据近日调查，草履蚧若虫进入严重危害期，大量吸食树体汁液，并大量排泄蜜露污染树体和环境，当前应抓紧时机喷洒药剂进行杀灭，药剂可选用蚧螨灵 80-100 倍液。



臭椿沟眶象成虫

## 桃球蚧

据本次调查，桃球蚧除在桃树上危害外，对杏树危害也严重，还可危害紫叶李、樱花等各种植物，当前此虫危害严重，大量虫体密集在枝条上吸食汁液，造成树势衰弱，枝条干枯死亡。当前可采用人工刮除防治，药剂防治可选用蚧螨灵、吡虫啉。

## 蚜虫

据本次调查，多种蚜虫发生，部分蚜虫严重危害，造成枝叶卷缩、增生，排泄物污染树体环境，影响市容观瞻，危害严重的种类有：桃蚜、桃粉蚜、栾多态毛蚜、绣线菊蚜、棉蚜、榆秋四脉绵蚜等，尚有毛白杨蚜、月季长管蚜、白蜡卷叶绵蚜、桃瘤蚜、柳黑毛蚜、柳大蚜。常绿树上松大蚜、柏大蚜等亦可能在部分地段严重发生，各有关养管单位应注意调查，及时防治，防治用药应选用1.2%苦烟乳油1000倍液或5%吡虫啉乳油、10%吡虫啉可湿性粉剂2000倍液。

## 小线角木蠹蛾

据本次调查，小线角木蠹蛾幼虫取食量加大，排泄物增多，当前应抓紧时机进行药剂注射防治，争取在五月中旬化蛹前普遍防治一次。以减少化蛹及成虫羽化数量，注射药剂应选用1.2%苦烟乳油100倍液。

## 光肩星天牛、云斑天牛

此两种钻蛀害虫当前是幼虫危害阶段，五月中旬化蛹，此期是防治的最适阶段，防治仍采用药剂注射方法，药剂选用1.2%苦烟乳油100倍液。

## 白粉病

据本周初调查，部分黄杨白粉病较为严重，可喷洒200倍液晶体石硫合剂或采用粉锈宁、托布津等杀菌剂进行防治，此期也应注意月季白粉病防治。

## 其它病虫

当前应注意防治的病虫有杨树腐烂病、杨树溃疡病、泡桐丛枝病、叶螨、六星黑点豹蠹蛾、臭椿沟眶象等。