

园林病虫害信息

第九期（总第 476 期）

天津市市容和园林管理委员会
天津市园林绿化研究所植保中心

2016 年 05 月 04 日
植保热线：84268088



美国白蛾

据近日调查，今年一代美国白蛾幼虫已开始孵化，初孵幼虫集中在叶片上危害，并形成初生网幕，网幕大小 10cm 左右。据“五一节”前调查一代美国白蛾成虫在 4 月下旬开始产卵，卵期 7-10 天。当前美国白蛾成虫（越冬代）、卵、幼虫同时存在，此期防治应及时喷洒除虫脲 6000-8000 倍液防治幼虫，对成虫羽化数量较大的地段应喷洒 1.2% 苦烟乳油 1000 倍液、1% 苦参碱 1000 倍液杀灭成虫，加强人工剪摘卵叶。



白蛾卵块



白蛾初孵幼虫

国槐尺蛾

据近日调查，国槐尺蛾一代幼虫虫体大小不一，个别大者已近 3 公分，此期能够见到成虫，应喷洒除虫脲 10000 倍液防治幼虫，注意检查如出现大量食害现象，可喷洒 1.2% 苦烟乳油 1000 倍液杀灭。



国槐尺蛾幼虫

春尺蛾

据近期调查，春尺蛾幼虫已近老熟，本月中旬可见该虫化蛹、越夏越冬。当前应抓紧时间进行喷药杀灭以减少越冬虫体数量，减轻翌年危害。药剂应选用 1.2% 苦烟乳油 1000 倍液、1% 苦参碱 1000 倍液，此期还应注意桑刺尺蛾幼虫的危害，防治同上，其幼虫已近老熟，亦应抓紧在化蛹前防治。



柑橘凤蝶幼虫

梨星毛虫

据本周初调查，梨星毛虫幼虫多数已近老熟，即将化蛹，有的已进入预蛹期，此期应抓紧时间及时杀灭老熟幼虫，对在花灌木上危害的梨星毛虫最好采用剪除有虫苞叶、杀灭幼虫为好，此期一般药剂防治效果差，药剂防治可采用 5% 吡虫啉乳油 2000 倍液。



草履蚧雌雄交尾



沟眶象成虫

榆绿叶甲、柑橘凤蝶

据本周初的调查，该两种害虫均为幼虫初孵期，虫体较小，可喷洒 1.2%苦烟乳油 1000 倍液杀灭。

草履蚧

据本周初调查，草履蚧雄成虫陆续羽化，并与雌成虫交尾，有的雌成虫已开始分泌蜡丝制造卵囊，尚未见到产卵。此期可喷洒 1.2%苦烟乳油或蚧螨灵杀灭成虫，还应对树体、墙体等处的虫体进行清理杀灭，减少此虫产卵数量。

桑白盾蚧、桃球蚧、沙里院褐球蚧

据本次调查，该几种蚧虫均在卵期，即将若虫孵化，望各养管单位注意检查，一旦查到若虫孵化，即刻喷洒 1.2%苦烟乳油或 1%苦参碱 1000 倍液杀灭，争取在若虫结蜡前将其杀灭，不可错过时机。

斑衣蜡蝉

据近日调查斑衣蜡蝉若虫孵化，此期即将进入孵化盛期，各单位要抓紧时间进行药剂杀灭，药剂选用 1%苦参碱 1000 倍液或 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液防治。

蚜虫

据近期调查，部分地段蚜虫发生仍很严重，有的已造成树木及地面油污，较为严重的有桃蚜、桃粉蚜、栾多态毛蚜、枫多态毛蚜、绣线菊蚜、棉蚜等，其他种类蚜虫个别发生较重，应抓紧防治，药剂防治应选用苦烟乳油、苦参碱和吡虫啉。

沟眶象

据本次调查，查到沟眶象成虫，当前在椿树上危害的主要还有臭椿沟眶象，以幼虫越冬的臭椿沟眶象其成虫即将羽化，杀灭成虫可喷洒绿色威雷 200-300 倍液，药液应均匀喷洒在枝干上，每隔 30-40 天喷洒一次。

小线角木蠹蛾、光肩星天牛、云斑天牛、六星黑点豹蠹蛾

该几种钻蛀害虫，仍在幼虫危害期，应继续进行药剂注射或剪除有虫枝防治，药剂注射应选用 1.2%苦烟乳油 100 倍液。

月季白粉病

据本次调查，一些地段查到月季白粉病，应注意检查，及时喷洒药剂防治，药剂可选用 15%粉锈宁 1500 倍液或 50%多菌灵 1000 倍液或 70%甲基托布津 1000 倍液。

其它应注意防治的病虫

日本菟丝子、黄杨白粉病、果树白粉病、柳毒蛾、杨扇舟蛾、黄杨绢野螟、柳厚壁叶蜂、卫矛矢尖盾蚧、山西品粉蚧、木虱、山楂叶螨等。

提示：请各养管单位及时悬挂诱捕器，诱杀国槐小卷蛾成虫。