

园林病虫害信息

第十期（总第 477 期）

天津市市容和园林管理委员会
天津市园林绿化研究所植保中心

2016 年 05 月 09 日
植保热线：84268088



美国白蛾

据近日调查，美国白蛾成虫陆续羽化、交尾产卵、幼虫孵



美国白蛾初孵幼虫

化。当前多为初孵幼虫，所结网幕 10cm 左右。此期仍应抓紧喷洒 6000-8000 倍除虫脲杀灭幼虫，也可人工剪除有卵叶片和初生网幕。成虫羽化较多的地块可喷洒 1.2%苦烟乳油 1000

倍液和 1%苦参碱 1000 倍液杀灭成虫，还可人工捕捉杀灭成虫。



枸杞负泥虫

国槐尺蛾

据本次调查，国槐尺蛾幼虫体长 3cm 左右，食叶量开始增大，当前仍可喷洒除虫脲 10000 倍液杀灭。如幼虫多数为大龄，应喷洒 1.2%苦烟乳油 1000 倍液或 1%苦参碱 1000 倍液杀灭。



黄杨绢野螟蛹及被害状

枸杞负泥虫

据近日调查，查到枸杞负泥虫成虫，正交尾产卵，尚未见到幼虫孵化，当前可喷洒 1.2%苦烟乳油 1000 倍液杀灭成虫，同时可杀灭初孵幼虫。



杨扇舟蛾幼虫

其它食叶害虫防治

据近期调查，我市发生的食叶害虫还有桑刺尺蛾、春尺蛾、杨扇舟蛾、柳毒蛾、榆毒蛾、杨柳小卷蛾、花椒凤蝶、榆绿叶甲等，均以幼虫食叶危害；另黄杨绢野螟均已进入蛹期，应注意检查防治。



榆毒蛾幼虫

草履蚧

据本周调查，多数有虫地段仍有成虫羽化交尾产卵，查到多为雌成虫，产卵数量较少，此期可人工清除树体上爬动的雌成虫，以减少产卵量，还可喷洒 80-100 倍液蚧螨灵杀灭。



榆绿叶甲幼虫

紫薇绒蚧

据本周初调查，紫薇绒蚧（石榴毡蚧）正值孕卵期，未见



紫薇绒蚧卵粒

若虫孵化，应注意检查，一旦发现若虫孵化，立刻喷洒 1.2%苦烟乳油 1000 倍液或 1%苦参碱 1000 倍液杀灭。

槐蚜

据上周末调查，槐树枝头布满槐蚜，吸食汁液危害，本月初调查数量明显增多，此期应抓紧防治，可喷洒 5%吡虫啉乳油 2000 倍液或 1.2%苦烟乳油 1000 倍液防治。

绣线菊蚜

据本周初调查，西府海棠等植株受绣线菊蚜危害严重，应抓紧喷洒 1.2%苦烟乳油 1000 倍液杀灭，另可人工剪除有虫枝头杀灭。

其它蚜虫

本市目前发生的蚜虫种类较多，较为严重的有棉蚜、桃蚜、桃粉蚜、金银木蚜、月季长管蚜、栾多态毛蚜、枫多态毛蚜、柳黑毛蚜、白蜡卷叶绵蚜、松大蚜、柏大蚜，个别地块植株发生严重，应注意检查防治。

桑始叶螨

据本周初调查，桑始叶螨初发生，应及时喷洒 1.8%阿维菌素 6000 倍液进行防治，此期更应注意山楂叶螨在碧桃、紫叶李、西府海棠等园林植物上的危害，应抓紧时间及时喷药防治。

小线角木蠹蛾

据本周初调查，小线角木蠹蛾幼虫仍在树体内大量食害，部分大龄幼虫进入老熟，即将开始化蛹，当前仍应抓紧时间进行药剂注射防治，此期亦应对西府海棠、国槐等受害树持续进行药剂注射防治。

其它钻蛀害虫

此期，光肩星天牛、云斑天牛幼虫也在幼虫危害期，应继续注射药剂防治，六星黑点豹蠹蛾老熟幼虫即将进入蛹期，6月上中旬将出现成虫羽化，此期仍可人工剪除有虫枝杀灭，各发生国槐小卷蛾的地段应悬挂诱捕器，诱杀国槐小卷蛾，谨记不要错过诱虫最佳时期。

白粉病

据本次调查，西府海棠、海棠、果树等个别植株白粉病较重，应注意防治。