

园林病虫害信息

第十一期（总第 478 期）

天津市市容和园林管理委员会
天津市园林绿化研究所植保中心

2016 年 05 月 16 日
植保热线：84268088



美国白蛾

据近日调查，越冬代成虫仍有羽化、交尾产卵。当前发生的一代幼虫，大部分为初孵幼虫和 1 龄幼虫，部分幼虫已达 2 龄，集中在网幕中危害，达 15-30cm，此期要继续做好喷洒除虫脲防治工作，喷洒一定



美国白蛾一龄幼虫

要全面周到，不能遗漏一株一枝一叶，以确保防治效果。除虫脲应喷洒 6000-8000 倍液，同时应开展人工剪除网幕和有卵叶片，杀灭幼虫。



柳毒蛾幼虫

柳毒蛾

据近日调查，部分杨树上柳毒蛾幼虫危害，幼虫虫体已达 3cm 左右，有的已近老熟，该虫主要食害杨、柳，近年发生较少，但调查时多次均查到该虫危害杨树，因此有管护杨、柳树的单位注意检查，可喷洒 1.2% 苦烟乳油 1000 倍液杀灭。



白蜡卷叶绵蚜

榆绿叶甲

据本次调查，榆绿叶甲幼虫正在危害榆树，幼虫体长 1.5cm 左右，食叶量开始增大，此期可喷洒 1.2% 苦烟乳油 1000 倍液杀灭，各养管单位还应注意检查金叶榆有无此虫危害，该虫也食害金叶榆。



柿绒蚧

棉蚜

据本次调查，棉蚜危害日趋严重，主要危害寄主有木槿、石榴、花椒、黄杨、粉八宝（八宝景天）等，本次调查到黄杨受害较重，很多枝头布满蚜虫虫体，分泌蜜露，使枝头皱缩、油污，影响生长和观瞻。应及时喷洒 1.2% 苦烟乳油或 1% 苦参碱 1000 倍液杀灭。



草履蚧雌成虫



枣大球蚧及卵粒

白蜡卷叶绵蚜

据本次调查，多数白蜡受该虫危害，枝头叶片卷缩成团，虫体在卷缩叶片背面危害，数量很大。此期防治可人工剪除受害严重枝头，消灭部分蚜虫，同时喷洒5%吡虫啉乳油或10%吡虫啉可湿性粉剂2000倍液防治。

草履蚧

据近日调查，草履蚧雌雄交尾均已结蜡，部分雌成虫开始寻找适宜产卵场所产卵，越夏越冬，亦有大部分雌成虫下树，爬向墙体和杂物处，在墙体基部浅土中或在砖石杂物下面产卵，亦可在树体洞穴和翘皮下面产卵。此期应开展人工清除下树和建筑物周边的雌成虫杀灭，亦可在树干下部绑草诱杀雌成虫产卵，然后集中销毁杀灭雌成虫和卵。同时做好树体周围环境卫生，减少越夏越冬场所、数量。

蚜虫

据近日调查发生较为严重的蚜虫还有槐蚜、绣线菊蚜、桃蚜、桃粉蚜、金银木蚜、柳黑毛蚜等，此外月季长管蚜、毛白杨蚜、栾多态毛蚜、枫多态毛蚜、竹凸唇斑蚜、榆斑蚜、榆秋四脉绵蚜、榆瘿绵蚜、柏大蚜、松大蚜等个别地段有发生，各单位应注意检查防治。防治用药应采用1.2%苦烟乳油1000倍液、1%苦参碱1000倍液或5%吡虫啉乳油2000倍液防治。

蚧虫

据近日调查，我市发生的蚧虫部分处在孕卵期和子虫孵化期，如桃球蚧、沙里院褐球蚧、卫矛矢尖盾蚧、桑白盾蚧、紫薇绒蚧、枣大球蚧、瘤坚大球蚧、柿绒蚧（柿树白毡蚧）等，子虫期（若虫初孵期）可喷洒1%苦参碱1000倍液、1.2%苦烟乳油1000倍液防治，若虫结蜡初期可喷洒5%吡虫啉乳油2000倍液防治。

沟眶象

据近期调查，连续查到成虫，亦见到成虫交尾，同期还有臭椿沟眶象成虫，此期杀灭成虫可喷洒“绿色威雷”200-300倍液，每隔30天喷洒一次。

小线角木蠹蛾

近期调查，小线角木蠹蛾幼虫仍在大量食害，部分老熟幼虫即将进入蛹期，此期应抓紧时间注射防治，杀灭老熟幼虫，防止化蛹，减少成虫羽化产卵，减轻危害，注射药剂应选用1.2%苦烟乳油100倍液。

其它应注意防治的病虫

有白粉病、叶螨、瘿螨、木虱、斑衣蜡蝉、光肩星天牛、云斑天牛、六星黑点豹蠹蛾、国槐小卷蛾、梨星毛虫、杨扇舟蛾、黄杨绢野螟等，各养管单位应注意检查防治。