

第十三期（总第 480 期）

2016年05月30日
植保热线：84268088

☆☆

美国白蛾

据近日调查，美国白蛾多数幼虫已达 3 龄，个别达到 4 龄已开始破网，食害叶片量加大，还有部分 2-3 龄幼虫仍在网幕中危害。本次调查仍可查到成虫及卵，预计 6 月上旬成虫羽化结束。此期防治可针对 3-4 龄幼虫喷洒 1.2% 苦烟乳油 1000 倍液或 1% 苦参碱 1000 倍液，对未喷洒过除虫脲防治 2-3 龄的地段仍可喷洒除虫脲 6000-8000 倍液防治。同时人工剪除网幕、杀灭幼虫工作应继续开展。



白蛾网幕



梨星毛虫成虫交尾

梨星毛虫

据本次调查，查到较多梨星毛虫（梨叶斑蛾）成虫。成虫交尾盛期并产卵于叶片上，尚未见到幼虫。预计 6 月上旬可见初孵幼虫危害，为此，当前应喷洒 1.2% 苦烟乳油 1000 倍液杀灭成虫，待 7-10 天后再喷洒一次，以杀灭初孵幼虫。



榆绿叶甲

据近日调查，榆绿叶甲老熟幼虫均已进入蛹期，在树干缝隙、疤痕翘皮下等部位可见可观数量老熟幼虫堆集化蛹。当前可人工刮除、销毁，防治要及时，一定要在其羽化之前完成此项工作。



榆绿叶甲群集化蛹

白蜡绵粉蚧（白蜡囊蚧）

据本次调查，个别地段一些白蜡植株白蜡绵粉蚧发生严重，此期正值子虫孵化期，子虫（初孵若虫）群集，尚未分散，正值最佳防治期。当前应及时喷洒 1.2%苦烟乳油 1000 倍液或 1%苦参碱 1000 倍液杀灭初孵若虫，当若虫分散爬向枝条和叶片时应改喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液防治。此期还可



柳毒蛾成虫产卵

剪除受害严重枝，销毁杀灭。

草履蚧

据本周初调查，草履蚧雌成虫多数已进入产卵期，雌成虫爬向墙体与地面接触部位，在土堆下做囊产卵，亦有少数雌虫在树体缝隙、疤痕翘皮下产卵，当前应开展人工挖扫虫卵防治。

梨冠网蝽

本次调查，部分地段西府海棠梨冠网蝽发生严重，据查仍有严重发展趋势，当前可见到成虫、若虫共同在叶背危害使叶片褪绿，且产生大量黑色油污，污染树体和环境。此期可喷洒 1.2% 苦烟乳油 800-2000 倍液，或 5% 吡虫啉乳油 2000 倍液。

蚜虫

据近日调查，杨花毛蚜、栾多态毛蚜、白蜡卷叶绵蚜、槐蚜、棉蚜、绣线菊蚜等仍严重危害，此外，柳黑毛蚜、柳矮蚜发生日趋严重。还有松大蚜、竹凸唇斑蚜、桃瘤蚜等多种蚜虫仍有不同程度发生。应注意检查防治，防治用药应选苦烟乳油、吡虫啉等。

青桐木虱

据本次调查，青桐木虱在青桐种植地段均有发生，发生初期可见有白色絮状蜡丝飘落地面污染环境。此期可先选择喷洒清水冲刷树体上虫体，减轻危害，然后再喷洒 10% 吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液，杀灭残存虫体。

请同时注意防治合欢木虱和皂荚木虱。

国槐小卷蛾

今年我市悬挂国槐小卷蛾性诱捕器地段很少。据本次调查，尚未见到国槐小卷蛾危害干叶、落叶现象，望各单位注意检查，一旦查到幼虫孵化蛀入危害立即开始药剂防治，药剂可选用苦烟乳油、吡虫啉、阿维菌素等。

此期还应注意防治的病虫害

黄杨绢野螟、国槐尺蛾、枸杞负泥虫、榆毒蛾、柳毒蛾、黄钩蛱蝶、柑橘凤蝶、棉铃虫、斑衣蜡蝉、山楂叶螨、光肩星天牛、小线角木蠹蛾、六星黑点豹蠹蛾、白粉病等。

六月份防治要点

1. 美国白蛾：六月份是美国白蛾一代幼虫严重危害期，应做好人工剪除网幕防治。在幼虫破网前仍可喷洒 20% 除虫脲 6000 倍液防治。幼虫破网后应改喷 1.2% 苦烟乳油或 1% 苦参碱 1000 倍液。本月下旬将有老熟幼虫化蛹，为此 6 月下旬至 7 月上旬期间应释放白蛾周氏啮小蜂防治一代蛹。

2. 刺吸害虫：应注意多种蚜虫的防治，并注意日本龟蜡蚧、槐坚蚧、沙里院褐球蚧、柿绒蚧、紫薇绒蚧、白蜡绵粉蚧、金叶女贞粉蚧等若虫孵化，初孵若虫是蚧虫防治的最佳时期，在此期喷洒 1.2% 苦烟乳油 1000 倍液防治。还应重点防治三种木虱（合欢木虱、皂荚木虱、青桐木虱）和叶蝉、山楂叶螨、朱砂叶螨、杨始叶螨、桑始叶螨等。

3. 钻蛀害虫：六月份小线角木蠹蛾成虫和光肩星天牛、云斑天牛成虫陆续羽化，部分幼虫继续危害，应坚持进行注射药剂防治幼虫。于成虫羽化期喷洒“绿色威雷”防治天牛成虫。喷洒 1.2% 苦烟乳油杀灭小线角木蠹蛾成虫，注意六星黑点豹蠹蛾成虫羽化及幼虫蛀入期的药剂防治。

4. 病害：应着重防治黄杨、月季白粉病，应选用粉锈宁、托布津、多菌灵等药剂防治。