

园林病虫害信息

第十四期（总第 481 期）

天津市市容和园林管理委员会
天津市园林绿化研究所植保中心

2016 年 06 月 06 日
植保热线： 84268088



美国白蛾

据近日调查，美国白蛾一代幼虫已达 4 龄。多数幼虫已破网危害，还有部分 2-3 龄幼虫仍在网幕中危害。此期防治对已破网分散危害的幼虫立即喷洒 1.2% 苦烟乳油或 1% 苦参碱 1000 倍液进行杀灭，对尚在网幕中危害的 2-3 龄幼虫应先剪除网幕，然后再喷药杀灭漏网幼虫。



白蛾网幕

丝绵木金星尺蛾

据本周初调查，查到丝绵木金星尺蛾幼虫危害黄杨，目前虫体大小为 3 厘米左右，虫龄已达 4 龄。该虫在我市一年发生 3 代，以蛹在土中越冬，三代幼虫危害期分别在 5 月下旬-6 月中旬（一代）、7 月中旬-8 月上旬（二代）、8 月中旬-10 月（三代）。食害植物有黄杨、丝绵木、卫矛（胶东卫矛、华北卫矛）、女贞、扶芳藤、榆、榔榆、杨、柳、槐等，此虫易造成叶片被吃光现象，幼虫有吐丝、假死习性。发现危害应及时喷洒 1.2% 苦烟乳油 1000 倍液。



丝绵木金星尺蛾幼虫

斑衣蜡蝉

据近日调查，斑衣蜡蝉若虫在栽植椿树、千头椿等地段数量仍很大，若虫多在叶片背面和嫩枝条上栖息危害，当前应及时喷洒 10% 吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液杀灭，以减少其危害和对环境的污染。



山楂叶螨

山楂叶螨

据本次调查，在西府海棠上山楂叶螨危害较重，延路观察，一些碧桃、紫叶李叶片颜色变枯黄色，已有叶片脱落，乃山楂叶螨危害所致，为此要求各养管单位应对那些紫叶树种认真巡查，发现山楂叶螨危害及时防治，药剂应选用 1.8% 阿维菌素 6000 倍液喷洒。



小线角木蠹蛾蛹皮



桃红颈天牛被害状

桑白盾蚧

据本次调查，在国槐树上桑白盾蚧发生严重，造成分枝点及枝干上有大量雄虫壳和雌虫，致使枝干部位被白色空壳覆盖，观之如覆盖一层白雪，此虫还严重危害白蜡、碧桃、桃、椿、青桐、法桐等多种乔木和花灌木，此虫体现为一龄若虫。当前防治应采取先人工刮除树体上虫壳及虫体，然后喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液或喷洒 400 倍晶体石硫合剂杀灭若虫。

桃瘤蚜

据近期调查，我市部分地段均出现桃瘤蚜危害，危害造成叶片卷边膨胀，叶片边缘由浅红色变褪色，影响观瞻和植物的正常生长，当前可人工剪除部分受害枝条，然后再喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液防治。

小线角木蠹蛾

据本周初调查，小线角木蠹蛾成虫羽化，在个别地段、个别植株羽化数量较大，单株达到几十头之多，据查，成虫羽化较多的植株均为本年或多年未进行认真防治的植株，树体受损严重，满地都是该虫啃咬排出的碎屑，当前对已开始成虫羽化的地段应喷洒 1.2%苦烟乳油 1000 倍液杀灭成虫（亦可灯光诱杀成虫）。成虫羽化期较长，视该虫羽化情况连续进行喷药防治。

桃红颈天牛

据本次调查，个别地段植株桃红颈天牛危害严重，当前可见到在桃树干周围地面满是其红褐色排泄物，其数量之大令人惊叹，这也说明树干内有很多幼虫在危害。针对幼虫可通过钩堵的方法进行杀灭，亦可人工注射 1.2%苦烟乳油 100 倍液杀灭。

光肩星天牛

据查，自本周初光肩星天牛羽化以来，成虫羽化数量将增多，为减轻其补充营养危害枝条可喷洒 1.2%苦烟乳油 1000 倍液杀灭成虫。另外，为了杀灭陆续羽化的成虫应喷洒绿色威雷 200-300 倍液，每 30 天喷洒一次（主要喷洒枝干）至 8 月下旬。此期亦可随时人工捕捉成虫杀灭。

白粉病

据近期调查，仍有部分地段黄杨白粉病、果树白粉病严重发生，本次调查部分地段蔷薇白粉病也发生严重，应喷洒粉锈宁、托布津等杀菌剂防治。

其它应注意防治的病虫

玄灰蝶、国槐尺蛾、蚜虫、蚧虫、木虱、叶蝉、叶螨、六星黑点豹蠹蛾、国槐小卷蛾、云斑天牛、臭椿沟眶象。