

# 园林病虫害信息

第十五期（总第 482 期）

天津市市容和园林管理委员会  
天津市园林绿化研究所植保中心

2016 年 06 月 13 日  
植保热线： 84268088



## 美国白蛾

据近日调查，美国白蛾一代幼虫多数已进入 4 龄，开始破网分散危害，少数幼虫处于 3 龄阶段，仍在网中危害。今年一代美国白蛾发生地段较去年多，各养管单位应引起重视，认真巡查，发生地段及时喷洒药剂防治，药剂应选用 1.2% 苦烟乳油或 1% 苦参碱 1000 倍液进行杀灭。截止目前调查尚未见到吃光现象，个别小枝有光秃，此期还应继续人工剪除网幕防治。



白蛾网幕

## 榆绿叶甲

据本周初调查，榆绿叶甲成虫陆续羽化，在叶片可查到成虫取食危害。观察上一代榆绿叶甲化蛹数量较多，预计成虫羽化数量将会很大，故此，应对有成虫羽化的地段及时喷洒 1.2% 苦烟乳油或 1% 苦参碱 1000 倍液杀灭成虫，以减少成虫孕卵数量和幼虫危害。



榆绿叶甲成虫

## 山楂叶螨

据近期调查，此期山楂叶螨在我市部分地段中发生严重，主要危害对象是西府海棠、碧桃、紫叶桃、紫叶李、山楂果树等，有的受害严重，在植株枝叶处密布丝网，山楂叶螨在丝网上穿行，叶片失绿，干枯。当前一定要抓紧防治，药剂可选用以 400-500 倍液晶体石硫合剂药液淋洗式喷雾杀灭。



枸杞负泥虫成虫

## 黄杨红蜘蛛

据本次调查，部分黄杨受红蜘蛛危害严重，受害叶片失绿、呈灰绿色，叶片正面有很多红蜘蛛爬行取食危害，叶面布有网丝和粉尘，应注意检查防治，药剂应选用阿维菌素或石硫合剂喷雾。



黄杨红蜘蛛

## 叶螨

进入6月份我市多数乔木上也有叶螨发生危害，受害较为严重树木有国槐、龙爪槐、蝴蝶槐、金枝槐、法桐、椿树、白蜡、杨、柳、桑等，丝棉木、苦楝也可受到严重危害，另外在女贞、小檗、月季、蔷薇等花灌木上也易受到朱砂叶螨严重危害，各养管单位应注意检查防治。防治药剂为阿维菌素、石硫合剂。

## 蚜虫

据近期调查，我市仍有几种蚜虫严重危害，如棉蚜、柳黑毛蚜、锈线菊蚜、槐蚜、白蜡卷叶绵蚜、桃瘤蚜、毛白杨蚜、月季长管蚜等，应注意检查防治，尤其应重点做好防治槐蚜、棉蚜、柳黑毛蚜的工作，以减少对环境污染和影响观瞻。

## 国槐小卷蛾

据近日调查，国槐小卷蛾幼虫已开始蛀入叶柄基部取食危害，可见受害叶片萎蔫，干枯。今年我市悬挂诱捕器的单位处点非常少，为此希望大家抓紧时间及时喷洒药剂杀灭成虫和初蛀入幼虫及转移危害的幼虫，以防扩散。药剂应选用1.2%苦烟乳油或10%吡虫啉可湿性粉剂2000倍液，也可喷洒1.8%阿维菌素6000倍液同时有兼治国槐红蜘蛛作用。

## 小线角木蠹蛾、光肩星天牛

据近日调查，此二种钻蛀害虫，其成虫陆续羽化，正值成虫防期，应加强成虫的药剂防治，药剂可选用苦烟乳油（小线角木蠹蛾、光肩星天牛）或绿色威雷。

## 其它应注意防治的病虫

此期应注意防治的病虫有：国槐尺蛾、枸杞负泥虫、刺蛾、柳毒蛾、梨星毛虫、黄杨绢野螟、含羞草雕蛾、斑衣蜡蝉、蚧虫、合欢木虱、青桐木虱、桑白盾蚧、卫矛矢尖盾蚧、金叶女贞粉蚧、叶蝉、梨冠网蝽、娇膜肩网蝽、臭椿沟眶象、云斑天牛、六星黑点豹蠹蛾、白粉病、日本菟丝子。