

园林病虫害信息

第十六期（总第 483 期）

天津市市容和园林管理委员会
天津市园林绿化研究所植保中心

2016 年 06 月 20 日
植保热线：84268088



美国白蛾

据近日调查，一代美国白蛾幼虫分散食叶危害，个别虫体已近老熟，开始化蛹。当前应抓紧时间喷洒 1.2%苦烟乳油或 1%苦参碱 1000 倍液杀灭幼虫，减少其化蛹数量，以减轻二代美国白蛾的危害。预计本月下旬可进行以虫治虫的生物防治，释放白蛾周氏啮小蜂。



玄灰蝶成虫及幼虫

榆绿叶甲

据本周初调查，榆绿叶甲成虫陆续羽化并危害，尚未见到幼虫危害，当前应喷洒 1.2%苦烟乳油 1000 倍液杀灭成虫，以减少成虫产卵和幼虫孵化，对金叶榆也应注意检查防治。



卫矛矢尖盾蚧若虫

枸杞负泥虫

据近期调查，该虫在栽有枸杞的地段均有发生，当前成虫、幼虫都在危害，可喷洒 1.2%苦烟乳油 1000 倍液杀灭。



白蜡卷叶绵蚜被害状

玄灰蝶

据近期调查，玄灰蝶成虫在粉八宝周围飞舞、交尾、产卵，在粉八宝叶片上有幼虫钻蛀，取食叶肉部分，受害叶片干枯，失去观赏价值，此期可喷洒苦烟乳油或 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液防治。



国槐小卷蛾被害状及幼虫

应注意防治的其它食叶害虫

二代国槐尺蛾初孵幼虫、双齿绿刺蛾集中在叶背危害的初孵幼虫、小蓑蛾、梨星毛虫、含羞草雕蛾等。

卫矛矢尖盾蚧

据本次调查，危害黄杨的卫矛矢尖盾蚧在部分地段危害严重，一些黄杨球、绿篱受害严重，有的受害枝条干枯。当前在叶片上危害的是若虫，虫体大小不一，可采用蚧螨灵 100 倍液防治。

白蜡卷叶绵蚜

据本周初调查，白蜡卷叶绵蚜发生日趋严重，受害植株明显增多，枝头叶片卷叶严重，个别重剪树木整株树冠枝头全部卷缩，影响其正常生长，此期应适当剪除受害严重枝条，喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂或 5%吡虫啉乳油 2000 倍液防治。

国槐小卷蛾

据本周初调查，国槐小卷蛾幼虫蛀入危害，日渐增多，树冠明显看到萎蔫干枯叶片，此期是其蛀入和转移危害期，多数蛀入的幼虫在叶柄基部枝条处危害，当前可喷洒 1.2%苦烟乳油 1000 倍液或 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液，1.8%阿维菌素 6000 倍液亦有防治效果，并可兼治国槐红蜘蛛。

小线角木蠹蛾

据本周初调查，小线角木蠹蛾成虫仍在陆续羽化，树干上、树干基部地面上，明显查到其蛹皮。当前应抓紧时机杀灭成虫，凡有成虫羽化的地段应喷洒 1.2%苦烟乳油 1000 倍液杀灭成虫，其成虫有趋光性，成虫羽化多在傍晚，亦可采用灯光诱杀成虫，树体中仍有部分幼虫危害，此期亦应继续药剂注射防治。

六星黑点豹蠹蛾

该虫成虫羽化期为 6 月中旬，成虫羽化后即可交尾产卵，卵于 6 月下旬孵化为幼虫，7 月上中旬是其幼虫蛀入期。7 月中旬即可见枝头干枯受害现象，凡是去年发生该虫的地段应于 6 月末至 7 月中，继续喷洒 2-3 次 10%吡虫啉可湿性粉剂 1000 倍液，杀死初孵幼虫及初蛀入幼虫。

其它应注意防治的病虫害

各种蚜虫、木虱（合欢木虱、青桐木虱、皂荚木虱）、叶螨、斑衣蜡蝉、山西品粉蚧、日本龟蜡蚧、光肩星天牛、云斑天牛、桃红颈天牛、臭椿沟眶象、白粉病、叶斑病、日本菟丝子等。