

园林病虫害信息

第十八期（总第 485 期）

天津市市容和园林管理委员会
天津市园林绿化研究所植保中心

2016 年 07 月 04 日
植保热线：84268088



美国白蛾

据上周末调查，一代美国白蛾幼虫多数为老熟幼虫、蛹，个别地段可见成虫羽化。上周我市发放白蛾周氏啮小蜂防治一代蛹各单位已及时领取和释放。经查白蛾周氏啮小蜂成虫陆续羽化，由寄主中飞出，寻找美国白蛾蛹产卵寄生，为此再次强调，在放蜂后 5-7 天不要打任何杀虫剂，以免杀伤小蜂。当前对未放蜂地段可进行人工挖蛹，捕捉成虫防治。成虫羽化量大时可喷洒 1.2% 烟参碱或 1% 苦参碱 1000 倍液杀灭。此期在放蜂地段如见有成虫羽化，可人工捕捉杀灭，不要喷药防治。



斑衣蜡蝉若虫



二星叶蝉

刺蛾

据本周初调查，我市白蜡、月季、海棠、桑、杏等多种园林植物上均有刺蛾危害，以双齿绿刺蛾、黄刺蛾为多，刺蛾虫体大小不一，有初孵尚未分散危害的小幼虫，也有虫体达到 1 厘米多的大幼虫，此期可喷洒 1.2% 烟参碱乳油或 1% 苦参碱 1000 倍液杀灭。



小线角木蠹蛾蛹皮

二星叶蝉

据本次调查，在葡萄上查到二星叶蝉危害，受害叶片出现失绿斑点，该虫亦危害五叶地锦，8 月份危害更为严重，注意检查防治，防治药剂可选用 10% 吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液。



云斑天牛产卵刻槽

斑衣蜡蝉

据本周调查，该虫若虫继续危害，虫体颜色由黑白相间斑点变化为黑红白色斑点，个体也有所增大，刺吸危害也严重，排泄物增多，污染环境，扰民，此期可喷洒 1.2% 烟参碱乳油 1000 倍液或 5% 吡虫啉乳油 2000 倍液杀灭。该虫成虫于 8 月出现。务必于本月（7 月）杀灭若虫，以减少成虫羽化产卵。



日本菟丝子

桑始叶螨

据本周初调查，在部分桑树栽植地段，有此螨危害，受害叶片多沿叶脉出现褪绿斑，叶片正面叶脉两侧明显可见白色斑点，叶螨多在叶背危害，此期可喷洒1.8%阿维菌素6000倍液杀灭。

云斑天牛

据本周调查，部分物业小区内云斑天牛发生严重，树干上明显可见大量羽化孔。树干基部周围堆积大量排出的粪便，并可见成虫在树干上的产卵刻槽，此期正是云斑天牛成虫交尾产卵期，应喷洒绿色威雷200-300倍液杀灭成虫，也可直接喷洒1.2%烟参碱乳油800-1000倍液杀灭成虫，同时进行人工捕捉灭虫，注意安全。

小线角木蠹蛾

据本次调查，个别地段小线角木蠹蛾成虫羽化数量较大，在一大段树干上有几十头成虫羽化（可见留在羽化孔处的蛹壳），令人惊叹。这说明，该地段从未进行小线角木蠹蛾的正常防治，本次调查还查到新一代小线角木蠹蛾幼虫已孵化，并已蛀入树体开始取食危害。当前对小线角木蠹蛾防治应在成虫羽化地段喷洒1.2%烟参碱乳油1000倍液杀灭成虫，在已有初孵幼虫蛀入的地段应人工挖除初孵初蛀入幼虫，并结合药剂杀灭，药剂应选用1.2%烟参碱乳油100倍液注射防治。

日本菟丝子

本次调查在某物业小区，日本菟丝子危害严重，粉红色的茎蔓缠绕在植物上，吸收其营养物质，致使其枯萎死亡。我市自引种金叶女贞以来，即将日本菟丝子带入，多处常出现其严重危害情况，各养管单位应注意检查，及时清理防治。此期防治可人工剪除其枝蔓销毁，此项防治一定要在日本菟丝子开花前做完。受害严重者应连同寄主一并清除。当前其主要危害的植物有金叶女贞、黄杨等。

其它应注意防治的病虫害

国槐尺蛾、榆绿叶甲、黄杨绢野螟、蚜虫、叶螨、木虱、网蝽、臭椿沟眶象、六星黑点豹蠹蛾、槐小卷蛾、白粉病、月季黑斑病等。