

园林病虫害信息

第十九期（总第 486 期）

天津市市容和园林管理委员会
天津市园林绿化研究所植保中心

2016 年 07 月 11 日
植保热线：84268088



美国白蛾



据近日调查，一代美国白蛾成虫陆续羽化、产卵，二代美国白蛾卵、幼虫均可查到，此期应喷洒除虫脲 6000-8000 倍液杀灭初孵幼虫及低龄幼虫。据本次调查，在个别地段见到 2-3 龄幼虫，网幕达 30 公分左右。当前除及时喷洒除虫脲，还应巡查虫情，并结合剪除网幕防治。



梨星毛虫幼虫

梨星毛虫

据上周末调查，新一代梨星毛虫幼虫孵化，取食幼嫩叶片，并吐丝缀叶在其中危害，本次调查看到受害严重植株，整株叶片枯焦。不但影响观瞻，更影响其正常生长。当前可喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液防治。



黄刺蛾幼虫

黄刺蛾

据本周初调查，我市西府海棠等植物上有黄刺蛾危害，虫体大小不一，体长 1 厘米左右。有的已分散食叶危害。此期亦可见到双齿绿刺蛾主要危害白蜡，应注意检查一并防治，杀灭刺蛾幼虫应选用 1.2%烟参碱乳油或 1%苦参碱 1000 倍液。



丝绵木金星尺蛾成虫及幼虫

国槐尺蛾

据本周初调查，新一代国槐尺蛾初孵幼虫危害，虫体较小，该代幼虫在一年当中危害最严重，往往造成（吃光）现象，应注意检查防治。此期应喷洒除虫脲 10000 倍液防治。



合欢木虱

榆绿叶甲

据本周初调查，榆绿叶甲成虫、卵、幼虫均可查到，幼虫初孵，当前应喷洒 1.2%苦烟乳油 1000 倍液杀灭成虫、初孵幼虫，七天后再次喷洒一次，杀灭新孵化的幼虫，连续喷洒 2-3 次。



悬铃木方翅网蝽

丝绵木金星尺蛾

据本次调查，查到丝绵木金星尺蛾成虫和初孵幼虫，食害黄杨，可喷洒苦烟乳油或 1%苦参碱 1000 倍液杀灭。应连续检查虫情，视发生情况亦可再喷洒一次药剂，彻底将其杀灭。

木虱

据本周初调查，我市部分地段合欢木虱、青桐木虱发生严重。受害树叶片布满白色蜡丝，飘落地面，污染环境，需抓紧时机进行防治，防治药剂应选用10%吡虫啉可湿性粉剂2000倍液或用清水先冲刷树冠，再喷洒1.2%苦烟乳油或1%苦参碱1000倍液杀灭。

槐蚜

据本周初调查，槐蚜在某些路段和绿地中发生严重，虫体多集中在花序处及嫩枝头上危害，由于害虫大量吸取树体汁液，致使花蕾脱落，其大量分泌物飘落地面等处，污染道路、环境，并影响观赏，并使受害树如同油浸状。药剂防治可选用1.2%苦烟乳油1000倍液或5%吡虫啉乳油2000倍液杀灭，此期可应人工剪除有虫花序，减少营养消耗，确保树体正常生长。

悬铃木方翅网蝽

该虫近年随大量栽植法桐而带入我市，在部分地段有所发生，但尚未严重危害，为防止今后其严重扩散，各养管单位要加强检查，发现及时防治。药剂防治可用吡虫啉、烟参碱、苦参碱

黄杨红蜘蛛

据本周调查，部分绿地中黄杨球发生红蜘蛛严重，受害植株叶片明显脱绿，为灰绿、黄绿。一旦被害，全年叶片颜色不能恢复。除非彻底杀灭红蜘蛛，待其重新长出新叶片。当前可喷洒1.8%阿维菌素6000倍液。亦可喷洒400-500倍晶体石硫合剂防治。

斑衣蜡蝉

据本周初调查，斑衣蜡蝉成虫开始羽化，不久即可交尾产卵，各养管单位应注意检查防治成虫及老熟若虫，防治药剂应选用1.2%苦烟乳油1000倍液。

光肩星天牛

据本周初调查，光肩星天牛成虫羽化，7月上中旬是其羽化盛期，可喷洒绿色威雷200-300倍液杀灭。每隔10天喷洒一次，如发现成虫大量取食枝皮造成枯枝可喷洒1.2%苦烟乳油或1%苦参碱1000倍液杀灭补充营养的成虫，此期应开始注意其产卵，发现产卵刻槽，及时人工敲击杀死卵。

法桐白粉病

法桐白粉病在我市近年多有发生，其危害尚轻，但该病一旦扩展，将危害严重。当前应在发生地段喷洒粉锈宁或拖布津等杀菌剂防治，也可人工先剪除受害枝叶，然后再喷洒药剂防治。

其它应注意防治的病虫害

玄灰蝶、棉大卷叶螟、黄杨绢野螟、柳黑毛蚜、海棠潜叶蛾、毛白杨蚜、棉蚜、绣线菊蚜、山楂叶螨、截形叶螨、桑始叶螨、杨始叶螨、柳刺皮瘿螨、卫矛失尖盾蚧、山西品粉蚧、紫薇绒蚧、皂荚木虱、叶蝉、蝉、云斑天牛、小线角木蠹蛾、六星黑点豹蠹蛾、臭椿沟眶象、黄杨白粉病、月季白粉病等。