

园林病虫害信息

第二十期（总第 487 期）

天津市市容和园林管理委员会
天津市园林绿化研究所植保中心

2016 年 07 月 18 日
植保热线：84268088



美国白蛾

据近期调查，二代美国白蛾幼虫陆续孵化，并形成网幕，网幕 20 公分左右，虫龄多为 1 龄，也有 2-3 龄幼虫。此期仍应喷洒除虫脲 6000-8000 倍液进行防治。人工剪除网幕应同时进行。此期仍可见到成虫、卵，可喷洒 1.2% 苦烟乳油或 1% 苦参碱 1000 倍液杀灭成虫和初孵幼虫，二代美国白蛾较之一代寄主范围有所扩大，本次调查在核桃、榆树、法桐上也看到有其网幕，各养管单位应进行巡视检查，及时喷药、剪网防治。



二代白蛾网幕及幼虫

榆绿叶甲

据本周初调查，榆绿叶甲成虫、幼虫均在危害，此期应喷洒 1.2% 苦烟乳油 1000 倍液杀灭。



等多种植物



刺蛾

据近日调查，我市几种刺蛾幼虫均在危害，危害较重者是黄刺蛾、双齿绿刺蛾，此外中国绿刺蛾、扁刺蛾、白眉刺蛾也在危害，应注意检查防治，防治用药应选用 1.2% 苦烟乳油或 1% 苦参碱 1000 倍液。

方翅网蝽

据本次调查，部分地段法桐方翅网蝽发生严重，叶片上虫体数量较大，叶片受害出现腿绿色斑点，叶片苍白，叶背有大量排泄物，污染树体及环境。据近年调查我市多处栽植法桐地段有的发生但程度较轻。今年出现严重受害地段，如不重视防治，一经扩散蔓延，可造成严重危害。各养管单位应抓紧检查防治，防治可用 1.2% 苦烟乳油 1000 倍液或 10% 吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液杀灭。



光肩星天牛交尾



沟眶象成虫

方翅网蝽若虫、成虫及被害状

叶螨

进入8月份我市乔木上叶螨发生较多，如法桐、国槐、椿树、白蜡、丝棉木、苦楝、杨、柳等，应经常检查防治。一些果树（核桃、枣、苹果等）和花灌木有的也很严重，此期可喷洒1.8%阿维菌素6000倍液防治。

蚜虫

据近期调查，此期发生较为严重的蚜虫有槐蚜、棉蚜、柳黑毛蚜、白蜡卷叶绵蚜等，可喷洒烟参碱、苦参碱或吡虫啉防治。

光肩星天牛

据本次调查，仍查到光肩星天牛成虫羽化交尾，在树体上明显可见其新鲜的羽化孔和产卵刻槽，此虫多在杨、柳上危害，也可危害榆、枫、苦楝、桑等多种树木，应注意检查防治。当前对成虫羽化较多地段可喷洒1.2%苦烟乳油直接杀灭成虫，以减少其交尾产卵，然后再喷洒200-300倍液绿色威雷防治陆续羽化的成虫。此期还应人工敲击产卵刻槽杀灭卵及初孵幼虫。

小线角木蠹蛾

据本次调查，仍可查到小线角木蠹蛾成虫陆续羽化，其新鲜蛹皮掉落地面或外露在羽化孔处，为此，药剂杀灭成虫仍应进行，凡成虫羽化较多地块一定要喷洒1.2%苦烟乳油1000倍液杀灭成虫，以减少其交尾产卵。

其它应注意防治的病虫害

国槐尺蛾、黄杨绢野螟、棉大卷叶螟、含羞草雕蛾、木虱、紫薇绒蚧、柿绒蚧、日本龟蜡蚧、蝉、叶蝉、斑衣蜡蝉、梨冠网蝽、娇膜肩网蝽、六星黑点豹蠹蛾、臭椿沟眶象、沟眶象、黄杨白粉病、月季白粉病、法桐白粉病、日本菟丝子。