

园林病虫害信息

第二十四期（总第 522 期）

天津市市容和园林管理委员会
天津市园林绿化研究所植保中心

2016年08月17日
植保热线：84268088



美国白蛾



白蛾成虫羽化

据本周初调查，美国白蛾二代成虫陆续羽化，羽化数量明显增大，在个别地段和小区，成虫羽化数量很大，一株树干上可查到十几头成虫，有的地段成虫腹部被雀鸟啄食，翅膀落在地面，有如落英。根据近期观

察，部分地区今年成虫羽化量比例年为多，三代将会严重发生，甚至大发生，各单位不要掉以轻心，应发动人员认真巡回检查，及时杀灭成虫。当前杀灭成虫应选用 1.2%烟参碱 1000 倍液，连续喷杀。灯光也可诱集成虫，然后集中杀灭。此期成虫交尾产卵，在叶片上很易查到，尚未见到幼虫孵化和初生网幕，预计本月下旬即可见到幼虫孵化和初生网幕，可开始人工剪除有卵叶片和剪除网幕防治。本月下旬开始应喷洒除虫脲 6000 倍液-8000 倍液杀灭初孵幼虫。



黄刺蛾危害状



国槐尺蛾成虫



月季长管蚜危害状



日本龟蜡蚧危害状

刺蛾

据本周初调查，二代黄刺蛾、双齿绿刺蛾幼虫正在危害，虫体有时几头十几头在一片或一个枝条上蚕食叶片，造成叶片缺刻枝条光秃，此期应抓紧时间杀灭，药剂防治应选用 1.2%烟参碱 1000 倍液，也可人工剪除有虫叶枝防治。



国槐小卷蛾被害状

月季长管蚜

据本周初调查，我市多数月季植株有月季长管蚜危害，个别植株受害严重，整株枝条枝头叶片和花蕾布满虫体，影响其生长和开花，当前可喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液、1.2%烟参碱或 1%苦参碱 1000 倍液防治。

梨冠网蝽

据近日调查，我市部分地段的西府海棠等植物上梨冠网蝽发生数量很大，叶片受害后变色失绿，叶背布满虫体及烟油状排泄物，污染树体和环境。当前危害的虫态有成虫和若虫，可喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液杀灭，受害严重的枝头可以人工剪除销毁灭虫。

日本龟蜡蚧

据近日调查，日本龟蜡蚧若虫仍在叶片上危害，个体长大，尚未爬向枝条准备越冬，当前可喷洒蚧螨灵 80-100 倍液杀灭，也可采用其它溶蜡性较强的杀螨剂防治，但一定要注意安全。

国槐小卷蛾

据近日调查，国槐小卷蛾（过去称叶柄小蛾）在个别区域、地段发生较为严重，在国槐树冠上可明显看到大量的干枯复叶悬挂或落在地面，当前虫体大小在 6-7 毫米左右，仍在转移危害，可喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂 1500-2000 倍液或喷洒 1.8%阿维菌素 6000 倍液，可兼治国槐红蜘蛛。

当前应防治的其它病虫

国槐尺蛾（成虫）、大蓑蛾、榆绿叶甲、黄杨绢野螟、含羞草雕蛾、山西品粉蚧、卫矛矢尖盾蚧、斑衣蜡蝉、蝉卵枝、小线角木蠹蛾、光肩星天牛、沟眶象、六星黑点豹蠹蛾、日本菟丝子、白粉病、叶斑病。

更正：

由于工作失误，导致本年度总期数出现数字错误，自本期予以改正。敬请谅解。

植保中心