

园林病虫害信息

第四期（总第 533 期）

天津市市容和园林管理委员会
天津市园林绿化研究所植保中心

2017 年 03 月 29 日
植保热线：84268088



美国白蛾

据近期调查，美国白蛾越冬蛹仍未羽化，仍应进行人工挖蛹防治。

蚜虫

据近日调查，部分蚜虫若虫陆续孵化危害，当前查到绣线菊蚜、桃蚜、桃粉蚜、栎多态毛蚜、枫多态毛蚜、金银木蚜、柳倭蚜，在树体芽腋和树枝缝隙处栖息危害，应加强检查，及时喷洒 1.2%烟参碱乳油 1000 倍液或 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液防治。

草履蚧

据近日调查，草履蚧若虫已爬向树体、芽周围或嫩枝部位栖息危害，部分虫体已开始结蜡，当前仍有部分若虫陆续出蛰，此期可喷洒 1.2%烟参碱乳油 1000 倍液杀灭若虫，亦可喷洒蚧螨灵 80-100 倍液杀灭若虫。

桃球蚧

据本次调查，查到桃球蚧越冬若虫出蛰活动，此期多在母体四周固着，若虫虫体开始膨大。此期可人工刮除枝干上的出蛰若虫，亦可对枝干喷洒石硫合剂或蚧螨灵杀灭。

斑衣蜡蝉



枫多态毛蚜



草履蚧若虫结蜡



桃球蚧若虫



国槐小卷蛾越冬幼虫

据近期调查，我市部分地段的树木树体上仍有大量斑衣蜡蝉卵块，当前其卵尚未孵化，刮除卵块防治工作应及时进行，不应放弃。

国槐小卷蛾

据本次调查，我市部分未进行剪除槐豆荚杀灭越冬国槐小卷蛾幼虫防治的地段，现在豆荚中仍可查到越冬幼虫，当前豆荚中的幼虫尚未化蛹，提醒未剪除槐豆荚的单位，应抓紧时间及时剪除。

臭椿沟眶象

据本次调查，臭椿沟眶象越冬成虫已出蛰活动，即将交尾产卵，当前可在出蛰数量多的地段喷洒 1.2%烟参碱乳油 800-1000 倍液杀灭，大量发生的地段可人工捕捉。

其它应注意防治的害虫

梨星毛虫、春尺蛾、桑刺尺蛾、天幕毛虫、杨扇舟蛾、柳毒蛾、沙里院褐球蚧、红蜘蛛、光肩星天牛、小线角木蠹蛾、六星黑点豹蠹蛾、双条杉天牛等。

四月份防治要点

四月份应注意防治几种食叶害虫，即有：桑刺尺蛾、春尺蛾、梨星毛虫、柳毒蛾、杨扇舟蛾、天幕毛虫等，可喷洒 1.2%苦烟乳油或 1%苦参碱 1000 倍液杀灭。4月上旬开始注意检查美国白蛾越冬蛹成虫羽化，如若发现可采用人工捕捉和药剂杀灭防治成虫。

四月份注意几种钻蛀害虫的药剂注射防治和人工剪除有虫枝防治，药剂注射的主要防治对象有：小线角木蠹蛾、柳干木蠹蛾、光肩星天牛、云斑天牛、

双斑锦天牛等，药剂注射应选用1.2%苦烟乳油100倍液。剪除有虫枝的防治对象有：六星黑点豹蠹蛾、国槐小卷蛾、玫瑰茎蜂，此期还应注意防治双条杉天牛成虫和臭椿沟眶象成虫。

四月份多种蚜虫发生亦严重危害，应注意认真防治，重点防治对象有桃蚜、桃粉蚜、绣线菊蚜、月季长管蚜、柳黑毛蚜、栎多态毛蚜、枫多态毛蚜、棉蚜、金银木蚜、柳倭蚜、柏大蚜、松大蚜等，可喷洒1.2%烟参碱乳油1000倍液或蚧螨灵80-100倍液杀灭；蚧虫应注意草履蚧、桃球蚧、沙里院褐球蚧、桑白盾蚧等，可喷洒1.2%烟参碱乳油、1%苦参碱可溶液剂1000倍液或10%吡虫啉可湿性粉剂2000倍液杀灭；木虱注意防治合欢木虱、皂荚木虱；叶螨应注意杀灭山楂红蜘蛛、金银木红蜘蛛、草坪红蜘蛛等，可喷洒1.8%阿维菌素或石硫合剂杀灭。

病害应重点防治白粉病、可喷洒甲基托布津、粉锈宁或石硫合剂防治。对树木腐烂病、溃疡病可涂抹梳理剂进行防治。

做好防治国槐小卷蛾诱捕器、粘虫胶、诱芯的准备工作，以便适时悬挂。