

园林病虫害信息

第六期（总第 535 期）

天津市市容和园林管理委员会
天津市园林绿化研究所植保中心

2017 年 04 月 12 日
植保热线：84268088



美国白蛾

据本次调查，在室外调查点位上，仍未见到越冬蛹羽化成虫。另据室内观察，成虫已于本月 7 日见到羽化。预计本月中旬在城市较暖地段成虫将陆续羽化，下旬将全面羽化，羽化盛期在 5 月上旬。此期防治应开展人工捕捉成虫灭杀，成虫羽化数量较大时可喷洒 1.2% 烟参碱乳油或 1% 苦参碱可溶性液剂 1000 倍液杀灭。



美国白蛾越冬蛹

桑刺尺蛾

桑刺尺蛾又称桑褶翅尺蛾，为春季危害的食叶害虫，此虫的幼虫危害至 5 月下旬，然后开始下树陆续在植物根茎周围土壤中越冬，当前发现幼虫即刻喷洒 1.2% 烟参碱乳油或 1% 苦参碱可溶性液剂 1000 倍液杀灭。应注意观察，如果防治不到位可出现被吃光现象。主要食害对象有白蜡、金叶女贞等。同时应注意防治春季另外一种食叶害虫春尺蛾（又称沙枣尺蛾）。



桑刺尺蛾

梨星毛虫

据本周调查，在西府海棠、杜梨、梨等多种植物上仍有梨星毛虫危害。此期幼虫多在枝条顶端，幼嫩叶片吐丝缀叶，可喷洒 1.2% 烟参碱乳油或 1% 苦参碱可溶性液剂 1000 倍液或 10% 吡虫啉 2000 倍液杀灭。也可人工剪除有虫叶苞。



梨星毛虫

白蜡囊蚧

据本次调查，白蜡囊蚧雌成虫已开始产卵，尚未见到若虫孵化。白蜡囊蚧在我市曾严重发生，经多年



白蜡囊蚧



小线角木蠹蛾倒沫

防治已控制其危害。今年在个别地段又有所发生，应注意检查发现并及时防治。预计5月上旬若虫孵化，对初孵若虫可喷洒1.2%烟参碱乳油或1%苦参碱可溶性液剂1000倍液杀灭。注意灭杀若虫应在若虫固着结蜡前杀灭幼虫。

草履蚧

据本次调查，我市发生草履蚧地段若虫大小6-7毫米，全身覆有白色蜡粉，虫体多集中在幼嫩枝条和叶腋部位危害。并开始分泌恶露，污染环境。当前可喷洒1.2%烟参碱乳油或1%苦参碱可溶性液剂1000倍液或蚧螨灵等杀螨剂进行防治，也可人工刮除或剪除有虫枝杀灭若虫。

蚜虫

据本次调查，查到金银木蚜和枫多态毛蚜危害。当前我市发生危害的蚜虫有很多种，如桃粉蚜、桃蚜、绣线菊蚜、榆秋四脉蚜、榆斑蚜、棉蚜等，应注意检查防治。防治蚜虫最佳时间是花前花后，延缓防治将会造成严重危害。防治药剂为1.2%烟参碱乳油或1%苦参碱可溶性液剂1000倍液或10%吡虫啉可湿性粉剂2000倍液。

小线角木蠹蛾

据本次调查和过去调查，看到我市多处地段小线角木蠹蛾危害较重，受害树种主要有白蜡、西府海棠、国槐等。多见树体上和地面被排出的粪屑。此期至5月中旬是防治全年化蛹羽化和幼虫最佳时期，应抓紧时间进行药剂注射防治。

白粉病

据本次调查，海棠白粉病、果树白粉病发生严重，有的地段初绽放的枝条顶端叶片全部被白粉覆盖，影响其正常生长和成枝，应连续喷洒杀菌剂进行防治，药剂可选用粉锈宁和托布津。

其它应注意防治的病虫害

其它应注意防治的病虫害还有：天幕毛虫、杨扇舟蛾、柳毒蛾、榆绿叶甲、沙里院褐球蚧、桃球蚧、山楂红蜘蛛、金银木红蜘蛛、草坪红蜘蛛、光肩星天牛、六星黑点豹蠹蛾、国槐小卷蛾、臭椿沟眶象等。