

园林病虫害信息

第十期（总第 539 期）

天津市市容和园林管理委员会
天津市园林绿化研究所植保中心

2017 年 05 月 10 日
植保热线：84268088



美国白蛾

据本周初调查，一代美国白蛾正处于幼虫孵化盛期，初孵幼虫开始结网危害，此期尚可见到成虫和卵块以及正在产卵的成虫，当前应尽快完成全面喷洒除虫脲杀灭初孵幼虫的防治工作，同时还应进行人工剪除初生网幕、卵块和杀灭成虫的防治。



美国白蛾初孵幼虫

一代美国白蛾防治是全年美国白蛾防治的关键时期，应认真做好防治，今年全运会在我市召开，会期正是美国白蛾严重发生期，各养管单位应提前做好防治，创造良好环境，保证全会会圆满成功。



国槐尺蛾幼虫

国槐尺蛾

据近日调查，国槐尺蛾一代幼虫已达 3 龄，开始大量食害叶片，当前杀灭国槐尺蛾幼虫应喷洒 1.2% 烟参碱乳油或 1% 苦参碱液剂 1000 倍液为好。



梨星毛虫被害状

梨星毛虫


据本次调查，我市发生梨星毛虫的地段其幼虫危害已造成枯叶黄叶，影响观赏，当前幼虫已进入老熟，即将化蛹，此期应开展人工剪除虫苞，杀灭老熟幼虫及蛹的防治工作，减少成虫羽化和下一代的危害。



沙里院褐球蚧

榆绿叶甲

据本周初调查，榆绿叶甲幼虫孵化危害，幼虫为初孵幼虫和二龄幼虫，尚有部分卵尚未孵化，当前应喷洒 1.2% 烟参碱乳油 1000 倍液杀灭幼虫，同时可兼治在榆树上发生的几种蚜虫。



地表堆积的小线角木屑

沙里院褐球蚧

据本周初调查，沙里院褐球蚧正值若虫孵化初期，尚有部分卵即将孵化，此期应喷洒 1.2%烟参碱乳油 1000 倍液杀灭初孵幼虫，也可喷洒晶体石硫合剂 500 倍液杀灭若虫，同时可兼治山楂叶螨。

棉蚜

据近日调查，棉蚜在我市多数地段发生较重，棉蚜主要危害对象有木槿、石榴、黄杨、粉八宝、花椒等，当前可喷洒 1.2%烟参碱乳油 1000 倍液、1%苦参碱液剂 1000 倍液或 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液杀灭。

小线角木蠹蛾

据本周初调查，小线角木蠹蛾部分幼虫已近老熟，大量食害，即将开始化蛹，当前药剂注射应继续开展，对受害严重树应重点防治，及时修剪受害严重枝干，无保留价值的植株应及时清除，以免造成危险事故发生。

其它应注意防治的病虫害

桑刺尺蛾、杨扇舟蛾、柳毒蛾、枸杞负泥虫、草履蚧、桃球蚧、桑白盾蚧、卫矛矢尖盾蚧、木虱、斑衣蜡蝉、叶螨、国槐小卷蛾、光肩星天牛、云斑天牛、六星黑点豹蠹蛾、黄杨白粉病、法桐白粉病等。