

第十一期 (总第 540 期)

2017 年 05 月 17 日

植保热线：84268088

据近日调查，美国白蛾幼虫最大已达 2 龄，网幕 10 公分左右，初生网幕居多，当前仍应喷洒除虫脲 6000-8000 倍液杀灭幼虫，并开展人工剪除网幕防治。同时还可剪除有卵叶片，杀灭卵和初孵幼虫。



白蛾初生网幕

据本周初调查，梨星毛虫幼虫均已老熟并粘叶化蛹。蛹以白色丝网包裹，此期可人工剪除虫苞杀灭蛹。预计 10-15 天后，可见成虫羽化，成虫羽化时可喷洒 1.2% 烟参碱乳油或 1% 苦参碱液剂 1000 倍液杀灭。



据近日调查，国槐尺蛾幼虫已达 4 龄，食量大增，同时尚有部分 2 龄幼虫存在，此期可喷洒 1.2%烟参碱乳油或 1%苦参碱液剂 1000 倍液杀灭防治。



梨星毛虫化蛹

据本周初调查，山楂叶螨在部分地段的西府海棠、碧桃等植物上危害严重。在叶片背面有大量雌成螨、若螨，还有大量卵粒。单个叶片已部分变焦或干枯，有的叶片焦枯即将脱落。我市发生该螨严重地段预计 6 月中旬将会造成落叶危害。当前应抓紧药剂防治，防治药剂应选用 1.5%阿维菌素 6000 倍液或晶体石硫合剂 500 倍液杀灭。



竹凸脣斑蚜

据本周初调查，斑衣蜡蝉若虫大量孵化后群栖在树木枝条和叶片背面危害。还未大量吸食树体汁液排泄粘液，此期应抓紧喷洒 1.2%烟参碱乳油 1000 倍液杀灭。斑衣蜡蝉主要危害椿树和千头椿，其周边的其它树种也可在上栖息危害。为此喷洒防治时应一并将周边植物全面喷洒防治。



白蜡哈氏芫蜂

草履蚧

据本周调查，我市发生草履蚧地段多数为已变色的雌成虫。它们爬向树干周围、土块、砖石、草丛或墙根下面等处产卵越冬。近日还有市电视台报导，发生严重的地段有的爬向居民的居室中，既污染环境且扰民。各养管单位应及时检查，及时防治。当前可进行人工清理虫体铲除产卵的雌成虫，同时喷洒蚧螨灵 80-100 倍液杀灭幼虫。也可选用对人、环境安全的其它杀虫剂杀灭。

竹凸唇斑蚜

据近日调查，竹栽植的地段蚜虫发生严重，该虫主要在叶片背面危害，虫量很大，应喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液防治。

桃粉蚜、桃蚜

据本次调查，在碧桃上桃粉蚜和桃蚜发生严重。在严重发生地段，桃新枝枝头卷缩布满蚜虫脱下的皮和大量有翅蚜，严重影响枝条正常生长，造成蚜虫大量蔓延危害，当前应剪除受害严重枝条，然后喷洒 1.2%烟参碱乳油 1000 倍液防治。

青桐木虱

据本次调查，青桐木虱危害进入严重时期，木虱多集中叶片与叶柄连接处，已开始分泌蜡丝，有少量脱落，当前可采用先冲刷然后再喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液杀灭。

同时注意防治合欢木虱、皂荚木虱、黄栌丽木虱等。

小线角木蠹蛾

据本次调查，在发生小线角木蠹蛾的地段，明显看到其幼虫排出的大量粪屑。堆集在地面和悬挂在树体上。此期前年进入树体的幼虫均已老熟即将开始化蛹。6 月中旬可见到成虫羽化。当前防治仍可人工注射药剂，既可杀灭老熟幼虫，又可杀灭当年进入树体危害的幼虫。由于危害期长，注射药剂防治切记不可中断。

白蜡哈氏茎蜂

据本次调查，我市白蜡树上已见到白蜡哈氏茎蜂危害。由于发生较零星，可在剪除美国白蛾初生网幕时一并剪除杀灭即可。发生数量较多的地段可喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂 1000 倍液杀灭。

白粉病

据本次调查，我市部分黄杨、海棠、蔷薇、月季白粉病发生较前期更为严重。在法桐上白粉病也多有发生。各养管单位应积极进行防治，防治药剂参照前期。

其它应注意防治的病虫

桑刺尺蛾、柳毒蛾、杨扇周蛾、蓑蛾、榆绿叶甲、柑橘凤蝶、玄灰蝶、蚜虫、蚧虫、国槐小卷蛾、六星黑点豹蠹蛾、光肩星天牛、云斑天牛、臭椿沟眶象等。