

# 园林病虫害信息

第十四期（总第 543 期）

天津市市容和园林管理委员会  
天津市园林绿化研究所植保中心

2017 年 06 月 07 日  
植保热线：84268088



## 美国白蛾



美国白蛾网幕

据本周末调查，一代美国白蛾幼虫最大 4 龄，以 2-3 龄居多，破网分散危害的较少。此期防治可喷洒 1.2% 烟参碱乳油或 1% 苦参碱液剂 1000 倍液杀灭，对尚未破网危害的幼虫仍可人工剪除网幕，杀灭幼虫。



杨扇舟蛾幼虫

## 杨扇舟蛾

据本周初调查，杨扇舟蛾二代幼虫孵化并危害，幼虫多吐丝粘叶在其中危害，主要危害杨、柳树，当前可喷洒 1.2% 烟参碱乳油或 1% 苦参碱液剂 1000 倍液杀灭，也可人工剪除有虫枝叶杀灭。



石榴巾夜蛾幼虫

## 石榴巾夜蛾

据本周调查，在石榴上有食叶害虫石榴巾夜蛾危害，该虫寄主为石榴，也可危害蔷薇、月季、玫瑰等植物。食害叶片，虫体发生数量大时，可造成部分被吃光现象，当前于发生地段喷洒 1.2% 烟参碱乳油或 1% 苦参碱液剂 1000 倍液杀灭。



枸杞负泥虫幼虫

## 枸杞负泥虫

据本周初调查，枸杞负泥虫以幼虫危害，此期可查到幼虫，未见成虫和卵。由于该虫危害呈现脏兮兮症状，且叶片缺刻严重，应喷洒 1.2% 烟参碱乳油 1000 倍液杀灭。



小绿叶蝉及被害状

## 小绿叶蝉

据近日调查，部分碧桃栽植地段已有小绿叶蝉开始危害，该虫危害造成叶片失绿褪色，叶主脉两侧多出现苍白斑点。当前应喷洒 10% 吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液杀灭。



小线角木蠹蛾被害状

## 蚜虫

据近日调查，多处乔木和花灌木上蚜虫发生严重，有的已出现油污，污染环境。绣线菊蚜、柳黑毛蚜、白蜡卷叶绵蚜、棉蚜、桃粉蚜、槐蚜、月季长管蚜等，应重点进行防治，防治用药应喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液或 1%苦参碱液剂 1000 倍液。对部分被蚜虫覆满的枝头应先剪除销毁，然后再进行喷药防治，以增强效果。

## 山楂叶螨

据近期调查，部分地段的海棠、碧桃等受山楂叶螨危害严重，叶片上成螨和卵粒很多，有的已造成叶片失绿变色、吐丝拉网现象出现。提示各养管单位应及时检查防治，否则即将造成糊叶、落叶现象。防治用药应采用阿维菌素或石硫合剂。

## 小线角木蠹蛾

据本周初调查，查到个别地段白蜡树受害严重，树体上布满排泄物，成虫羽化后留在树干处的蛹皮明显可见，且数量多，凡出现此类新情况者必须马上喷洒药剂杀灭成虫，药剂应选用 1.2%烟参碱乳油或 1%苦参碱液剂 1000 倍液，根据羽化情况连续喷洒 2-3 次，喷洒范围应以发生树为基点，扩大至周围 50-100 米范围。

## 光肩星天牛

据本周初调查，光肩星天牛成虫陆续羽化，并开始取食嫩枝皮补充营养。此期防治应尽早对树枝干喷洒绿色威雷 200-300 倍液杀灭成虫，同时对树冠嫩枝条部位喷洒 1.2%烟参碱乳油 1000 倍液，杀灭补充营养的成虫。

## 国槐小卷蛾

据本周初调查，国槐小卷蛾幼虫已蛀入叶基危害，在树冠上可查到萎蔫的复叶叶片。此期可喷洒 10%吡虫啉 1000 倍液杀灭初孵幼虫和初蛀入幼虫。今年我市多数区县未悬挂诱捕器杀灭成虫，极可能造成该虫严重发生，各养管单位注意检查防治。

## 六星黑点豹蠹蛾

该虫一年发生一代，以幼虫越冬，成虫于 6 月上旬羽化，交尾后的雌成虫产卵于枝条或幼虫危害的虫道内，幼虫于 6 月下旬孵化蛀入枝条危害，该虫防治最佳时期为 6 月份，杀灭成虫和初孵幼虫可喷洒 1.2%烟参碱乳油或 1%苦参碱液剂 1000 倍液，杀灭初孵幼虫和初蛀入幼虫应喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂 800-1000 倍液。