园林病虫信息

第十五期（总第 544 期）

天津市市容和园林管理委员会　　2017 年06 月14 日
天津市园林绿化研究所植保中心　　植保热线：84268088

美国白蛾

美国白蛾网幕

据近日调查，部分美国白蛾幼虫分散危害，也有部分低龄幼虫仍在网幕中危害，此期防治应抓紧喷洒 1.2%烟参碱乳油或 1%苦参碱液剂 1000 倍液杀灭分散危害的幼虫，同时继续做好剪除网幕杀灭幼虫的防治，网幕剪除后应喷洒烟参碱乳油或 1%苦参碱液剂 1000 倍液杀灭遗留幼虫。

榆绿叶甲

据近日调查，榆绿叶甲成虫数量较多，取食叶片交尾产卵，预计 7-10 天后可见幼虫孵化，当前应杀灭成虫，喷洒药剂同上。

山楂叶螨

据近日调查，山楂叶螨严重危害碧桃等花灌木，部分地段的碧桃叶片焦枯脱落，不但破坏景观而且影响树木生长。受山楂叶螨危害的花灌木还有西府海棠、紫叶桃、紫叶李、山楂、苹果等多种植物。当前对已落叶的植株应喷洒石硫合剂杀灭枝条、枝干的成螨、若螨和卵，然后浇水加强养护管理，促其叶片生长。对尚有受害较重的植株可喷洒 1.8%阿维菌素 6000 倍液防治。

蚜虫

据本次调查，当前发生较为严重的蚜虫有绣线菊蚜、棉蚜、柳黑毛蚜、槐蚜、桃瘤蚜等，应注意检查防治。防治用药应选用 1.2%烟参碱乳油、1%苦参碱液剂 1000 倍液或 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液，其它蚜虫均应注意检查防治。

斑衣蜡蝉若虫

合欢木虱

国槐小卷蛾幼虫



花椒凤蝶

桃瘤蚜被害状

叶螨

六月份是多种叶螨的高发期，如：朱砂叶螨（月季、蔷薇等）、截形叶螨（国槐、龙爪槐、蝴蝶槐等）、杨始叶螨（杨、柳等）、桑始叶螨（桑），此外在法桐、椿树、白蜡、丝绵木、苦楝等乔木上也有叶螨发生，要加强检查，及时防治，防治用药应选用阿维菌素或石硫合剂等。

斑衣蜡蝉

据本周初调查，该若虫 2-4 龄，仍在树冠叶片处危害，预计本周末、下周初将有成虫出现，当前应抓紧时间喷洒 1.2%烟参碱乳油或 1%苦参碱液剂 1000 倍液杀灭若虫。

木虱

据本次调查，部分地段合欢木虱、青桐木虱危害严重，受害部位布满虫体，排泄蜡质分泌物，污染树木及周边环境，尤其是分泌物飘落下来，布满地面及其下的植物上面，油污一片，影响观瞻。当前可喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液杀灭，需连续喷洒 2-3 次，达到杀灭效果。此外还应注意皂荚木虱的危害与防治。

国槐小卷蛾

据本周初调查，国槐小卷蛾幼虫陆续蛀入枝条，伤害叶片，在树冠上可见萎蔫的叶片悬吊，当前可喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂 1000 倍液防治。如防治国槐红蜘蛛时喷洒 1.8%阿维菌素，对此时该虫也有兼治作用。

小线角木蠹蛾、光肩星天牛

据本周调查，两种害虫的成虫均在陆续羽化，当前防治成虫是关键，喷洒 1.2%烟参碱可杀灭该两种害虫成虫，喷洒绿色威雷也杀灭光肩星天牛成虫，且残效期较长。

其它应注意防治的病虫

其它应注意防治的病虫有：国槐尺蛾、枸杞负泥虫、花椒凤蝶（成虫）、网蝽、叶蝉、臭椿沟眶象、云斑天牛、六星黑点豹蠹蛾、白粉病、日本菟丝子等。