

园林病虫害信息

第十九期（总第 548 期）

天津市市容和园林管理委员会
天津市园林绿化研究所植保中心

2017 年 07 月 12 日
植保热线：84268088



美国白蛾



据本次调查，所查之处未见成虫羽化，亦未见二代卵，但在某物业小区的居民区内发现有二代初孵幼虫及初生网幕。鉴于

我市多数地段已进行放蜂防治，在放蜂地段务必不能进行药剂防治，此期各养管单位应进行全面检查（包括群众单位和有物业管理的小区），及时发现美国白蛾二代初孵幼虫，进行人工剪除有卵叶片和初生网幕的防治，如发现较多的成虫羽化地段，可喷洒 1.2% 烟参碱乳油或 1% 苦参碱液剂 1000 倍液杀灭。



蝉



白蜡卷叶绵蚜

蝉

据本次调查，常见的蚱蝉、蟋蟀蝉、岩崎蝉成虫均在陆续出土羽化，羽化后的成虫在树体栖息，尚未见到成虫产卵，当前可喷洒 1.2% 烟参碱乳油 1000 倍液杀灭成虫。



槐蚜

白蜡卷叶绵蚜

据近日调查，白蜡卷叶绵蚜日趋严重，树冠上明显可见卷缩的枝头叶片，亦可见到其分泌的蜡粉，污染环境，此期应喷洒 10% 吡虫啉可湿性粉剂 1500-2000 倍液杀灭，对有卷叶受害的枝头亦可人工剪除，杀灭虫体。



日本龟蜡蚧

柳黑毛蚜、娇膜肩网蝽

据近日调查，柳黑毛蚜危害柳树日趋严重，虫体数量明显增多，造成叶片油污光亮，同时在叶片背面有娇膜肩网蝽危害，使叶片失绿，出现大量灰白色斑，个别地段此期亦有红蜘蛛（杨始叶螨）危害，



小线角木蠹蛾新蛀入幼虫

从而使叶片失绿、变黄、脱落，应及时检查，可喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂 1500-2000 倍液，如有红蜘蛛危害可再喷洒 1.8%阿维菌素 6000 倍液杀灭。

槐蚜

据本次调查，槐蚜发生严重，个别地段国槐枝头花序布满蚜虫，油污光亮，大量丢失水分和营养，不但影响树体生长，亦污染环境，影响市容观瞻。各养管单位应及时检查，及时防治，防治用药应采用 10%吡虫啉可湿性粉剂 1500-2000 倍液及 1.2%烟参碱乳油 1000 倍液，对虫体布满的花序和枝头，应人工剪除。

日本龟蜡蚧

据近日检查，日本龟蜡蚧若虫陆续孵化，并多数在叶片上取食危害。该虫主要危害黄杨、枣、白蜡等多种树种，应注意检查杀灭，此期可喷洒 80-100 倍液蚧螨灵进行防治，并可剪除虫体数量多的枝头和叶片进行防治。

小线角木蠹蛾

据本次调查，小线角木蠹蛾仍有成虫陆续羽化，并已查到新蛀入的幼虫危害状，此期除应对树体内的大龄幼虫进行药剂注射防治外，应及时防治新蛀入幼虫，对新蛀入幼虫，可在蛀入孔处注射药剂杀灭尚未进入木质部的幼虫，并可人工挖除蛀入孔处的幼虫，初蛀入幼虫多集中在一处栖息危害，是人工挖治的好时机。但药剂注意不要扩大蛀入孔，伤及过多树皮，影响树体生长。

其它应注意防治的病虫害

当前应注意防治的食叶病虫害有：梨星毛虫、刺蛾、（黄刺蛾、双齿绿刺蛾）、国槐尺蛾、丝绵木金星尺蛾、棉大卷叶螟、黄杨绢野螟、玄灰蝶、柑橘凤蝶、榆绿叶甲等。应注意防治的刺吸害虫有：山楂叶螨、截形叶螨、桑始叶螨、杨始叶螨（危害杨、柳）、朱砂叶螨、呢柳刺皮瘿螨、斑衣蜡蝉、合欢木虱、皂荚木虱、青桐木虱、梨冠网蝽、悬铃木方翅网蝽、桑白盾蚧、卫矛矢尖盾蚧、山西品粉蚧、紫薇绒蚧、叶蝉、云斑天牛、六星黑点豹蠹蛾、臭椿沟眶象。法桐白粉病、黄杨白粉病、月季白粉病、月季黑斑病、日本菟丝子等。