

园林病虫害信息

第二十二期（总第 551 期）

天津市市容和园林管理委员会
天津市园林绿化研究所植保中心

2017 年 08 月 02 日
植保热线：84268088



美国白蛾

据本周初调查，美国白蛾二代幼虫多数已分散危害，少数幼虫已近老熟，还有较少低龄幼虫仍在网幕中危害。此期可根据虫龄大小对靶喷药防治，药剂可选用 1.2%烟参碱乳油或 1%苦参碱液剂 1000 倍液杀灭。注意检查老熟幼虫化蛹情况，适时进行挖蛹防治。



白蛾二代大龄幼虫

小蓑蛾



小蓑蛾

据本周初调查，在海棠上有小蓑蛾危害，幼虫食害叶片，多在叶片背面栖息，该虫危害多种植物，可喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂 1500-2000 倍液杀灭。



日本龟蜡蚧



梨冠网蝽

蚜虫

本次调查多种蚜虫有危害，危害较重的有绣线菊蚜、柳黑毛蚜，该两种蚜虫可喷洒 1.2%烟参碱乳油或 1%苦参碱液剂 1000 倍液杀灭，其它危害的蚜虫应针对其卷叶情况分别采用吡虫啉或烟参碱进行防治。



桃红颈天牛

蚧虫

据近日调查，日本龟蜡蚧、卫矛矢尖盾蚧多为 2-3 龄若虫，已经结有蜡壳，此期防治可喷洒 80-100 倍蚧螨灵杀灭，也可喷其它杀蚧药剂，但一定要注意安全（人、植物），对其它已结蜡危害的蚧虫均可采用蚧螨灵杀灭。



杨树腐烂病

梨冠网蝽

据本周初调查，危害在部分地段较为严重，应注意检查防治。该虫危害西府海棠、梨、杜梨等，排泄物污染树体及环境，受害植物叶片失绿变色但不脱落，影响观瞻。可喷洒 1.2%烟参碱乳油或 1%苦参碱液剂 1000 倍液杀灭其成虫及若虫。

天牛

据本周调查，查到桃红颈天牛仍在陆续羽化，在西府海棠上查到桑田牛、枝天牛危害，当前在我市主要危害园林植物的天牛有：光肩星天牛、云斑天牛、双斑锦天牛等，防治方法可选用人工钩杀幼虫或注射药剂杀灭幼虫。

国槐小卷蛾

据本周初调查，国槐小卷蛾正处在二代幼虫蛀入危害期，我市栽植的金枝槐有的地段亦受此虫危害，应注意检查及时防治。当前防治应喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂 1000-1500 倍液，杀灭转移危害的幼虫和正蛀入危害的幼虫。视受害严重程度可连续喷洒防治。

剪除枯枝、网幕

当前我市受蝉产卵危害造成大量有卵枯枝；受六星黑点豹蠹蛾危害造成有虫枯枝；受美国白蛾危害造成干枯网幕；受含羞草雕蛾危害造成有虫枯枝；受桃折枝虫危害造成有虫枯枝等，各养管单位应组织人力开展剪除枯枝防治，不错过人工防治的最佳时期。

其它应注意防治的病虫害

其它应注意防治的病虫害有：腐烂病、国槐尺蠖、刺蛾、棉大卷叶螟、方翅网蝽、娇膜肩网蝽、木虱、叶蝉、叶螨、小线角木蠹蛾、臭椿沟眶象、白粉病、日本菟丝子等。