

园林病虫害信息

第二十三期（总第 552 期）

天津市市容和园林管理委员会
天津市园林绿化研究所植保中心

2017 年 08 月 11 日
植保热线：84268088



美国白蛾

据本周初调查，二代美国白蛾幼虫多数老熟，进入化蛹阶段，少数幼虫仍在取食危害，预计近日将有二代成虫羽化，本月末将有新一代幼虫出蛰，本月下旬是成虫大量羽化期，当前可进行挖蛹防治，待成虫羽化后喷洒 1.2%烟参碱乳油或 1%苦参碱液剂 1000 倍液杀灭成虫，八月份是二、三代美国白蛾发生重叠期，各单位应加强检查，进行对靶防治。



大蓑蛾袋囊

大蓑蛾

据近期调查，大蓑蛾在我市多处有发生，该虫危害主要有法桐、泡桐、白蜡、海棠、石榴等多种植物，一年发生一代，以老熟幼虫在蓑囊中越冬，此期危害的既今年新一代幼虫。药剂防治可喷洒 1.2%烟参碱乳油 1000 倍液或喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂 1500-2000 倍液。



方翅网蝽若虫 成虫

方翅网蝽

据本周初调查，法桐方翅网蝽在我市多处发生，个别地段受害严重，叶片背面布满若虫、成虫，受害叶片为灰黄色，严重者叶片干枯，其排泄物污染树木及环境，应抓紧进行防治，防治用药应喷洒 10%吡虫啉 1500-2000 倍液、1%苦参碱液剂 1000 倍液或 1.2%烟参碱乳油 1000 倍液均可。



方翅网蝽被害状

蝉

据本次调查，蝉产卵枝明显增多，到处可见干枯的枝条，受害较为严重的园林植物有：杨、柳、榆、槐、白蜡、臭椿、海



蝉产卵枯枝



小绿叶蝉

棠、樱花、碧桃等。当前防治应人工剪除有虫枝集中销毁灭卵，同时可一并剪除美国白蛾网幕、六星黑点豹蠹蛾有虫枝。

小绿叶蝉

据本周初调查，危害碧桃、桃树、山桃等的小绿叶蝉日趋严重，有的已造成树木叶片褪绿，呈灰白色，受害树木叶片背面有较多数量若虫和成虫栖息，刺吸叶片汁液。当前可喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂 1500-2000 倍液防治。

小线角木蠹蛾

据本周初调查，小线角木蠹蛾大龄幼虫和新一代蛀入的低龄幼虫同时在树体中危害，我市也有多处西府海棠受害严重，个别地段白蜡、国槐也受害严重，当前应对新一代蛀入的低龄幼虫进行人工挖治与药剂注射相结合杀灭，同时应认真对树体大龄幼虫（去年蛀入的幼虫）进行药剂注射防治，注射药剂应选用 1.2%烟参碱乳油 1000 倍液，不要用 DDV、氧化乐果等有毒药剂，以确保环境及人身安全。

其它应注意防治的病虫害

其它应注意防治的病虫害有：国槐尺蛾、榆绿叶甲、刺蛾、卫矛矢尖盾蚧、日本龟蜡蚧、紫薇绒蚧、月季长管蚜、槐蚜、绣线菊蚜、棉蚜、木虱、梨冠网蝽、斑衣蜡蝉、叶螨、光肩星天牛、云斑天牛、六星黑点豹蠹蛾、臭椿沟眶象、国槐小卷蛾、黄杨白粉病、月季黑斑病、日本菟丝子等。