


第二十四期（总第 553 期）

2017 年 08 月 23 日

植保热线：84268088

☆☆

据近日调查，我市多处道路绿地、小区对二代美国白蛾防治效果很好，当前正是美国白蛾二代成虫羽化期，预计本月下旬即可见三代美国白蛾幼虫和初生网幕。此期防治目标应针对成虫，一切有成虫羽化的地段应及时喷洒 1.2%烟参碱乳油或 1%苦参碱液剂杀灭，以减少三代发生数量。如发现三代初孵幼虫和初生网幕应及时剪除网幕，喷洒 1.2%烟参碱杀灭幼虫也可。八月为美国白蛾二、三代发生重叠期。当前除有二代美国白蛾成虫、三代美国白蛾卵外，尚有二代美国白蛾蛹和大龄老熟幼虫，应一并注意检查，对靶防治。



据本周初调查，三代国槐尺蠖成虫羽化，并查到新一代幼虫，凡查到有新一代幼虫危害状的地段，应及时喷洒除虫脲10000 倍液防治。



据本次调查，双齿绿刺蛾幼虫正在危害，同期还有黄刺蛾幼虫，在月季上有小圆白刺蛾，白蜡树上有扁刺蛾，枣树上有褐边绿刺蛾的危害，应一并注意检查防治，防治用药应采用 1.2%烟参碱乳油 1000 倍液进行喷洒。



据本次调查,在木槿上有棉大卷叶螟危害,此时虫体较小,多三、五条集中在一个苞叶中危害,稍大时分散危害,此期可人工剪除有虫叶片杀灭幼虫或喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂 1500-2000 倍液杀灭。此虫还危害大花秋葵等锦葵科植物,也应注意检查防治。



榆绿叶甲

据本周初调查，榆绿叶甲幼虫正在危害，应注意对金叶榆、金枝榆、家榆等榆树进行药剂防治，还应注意榆树绿篱有无危害，药剂防治应喷洒 1000 倍液 1.2%烟参碱乳油。

蚜虫

据本周初调查，部分蚜虫在我市多有危害，主要有棉蚜（危害木槿、黄杨）、白蜡卷叶绵蚜、柳黑毛蚜、月季长管蚜等，分别喷洒烟参碱或吡虫啉进行防治。

梨冠网蝽

本周初调查，梨冠网蝽危害在有的地段发生严重，叶片背面布满虫体和烟油状排泄物，污染树体及环境，叶片失绿褪色，应喷洒 1.2%烟参碱乳油 1000 倍液杀灭。

法桐方翅网蝽

据本周初调查，我市多处法桐方翅网蝽危害严重，有的叶片背面有大量成虫、若虫，有的叶片背面布满初孵若虫，叶片失绿变黄，影响树木生长和环境美化观瞻。当前可喷洒 1.2%烟参碱乳油 1000 倍液或 10%吡虫啉可湿性粉剂 1500-2000 倍液防治。

山楂叶螨

据本周初调查，我市部分地段山楂叶螨仍有危害，尤其在碧桃、西府海棠等花灌木上要注意检查防治，对山楂、苹果等绿地中的果树也应注意检查防治。药剂防治应选用 1.8%阿维菌素 6000 倍液或晶体石硫合剂 400-500 倍液杀灭。

国槐小卷蛾

据近期调查，国槐小卷蛾幼虫仍处在幼虫转移危害阶段，受害叶片枯萎枯黄，并悬挂在树冠上，甚是难看，影响市容美化。当前可喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂 1500 倍液防治，也可喷洒 1.8%阿维菌素 6000 倍液，同时兼治国槐红蜘蛛（截形叶螨）。

法桐白粉病

据本次调查，我市多处法桐栽植地段，发生白粉病的叶片上有大小不同的白色病斑，受害严重者叶片失绿枯黄，极大影响观瞻。应及时喷洒粉锈宁或甲基托布津等杀菌剂控制其发展，亦可喷洒晶体石硫合剂 400-500 倍液防治。

其它应注意防治的病虫

其它应注意防治的病虫有黄杨绢野螟、含羞草雕蛾、紫薇绒蚧、斑衣蜡蝉、木虱、叶蝉、蝉、小线角木蠹蛾、光肩星天牛、六星黑点豹蠹蛾、日本菟丝子、黄杨白粉病等。