

第二十五期（总第 554 期）

2017 年 08 月 30 日

植保热线：84268088

☆☆



天津市园林绿化研究所

A circular inset image showing two whiteflies (Trialeurodes vaporariorum) on a green leaf. The insects are small, white, and have a yellowish base on their abdomens. They are positioned on the leaf surface, which shows some minor damage and small dark spots.

小绿叶蝉及矢绿树冠

槐蚱

蝉产卵枯枝

蝉

据本次调查，我市部分地段仍有较多被蝉产卵的枯枝，观之不雅，受害严重者树冠布满枯枝。枯枝内有大量蝉卵，应及时将其剪除销毁，杀灭枯枝中的卵，各养管单位应注意检查防治。

叶螨

据近期调查，我市仍有几种叶螨危害，如山楂叶螨、朱砂叶螨、杨始叶螨、桑始叶螨等，对其应喷洒 1.8%阿维菌素 6000 倍液杀灭，也可喷洒晶体石硫合剂 400-500 倍液防治。

网蝽

据本周初调查，我市仍有梨冠网蝽和法桐方翅网蝽严重危害，受害植株叶片明显变色、干枯，应抓紧时间防治，防治用药应选用 10%吡虫啉可湿性粉剂 1500-2000 倍液或 1.2%烟参碱乳油 1000 倍液。

国槐小卷蛾

据近日调查，我市国槐已陆续结荚，部分国槐小卷蛾幼虫已开始转移到豆荚中危害，待 9 月下旬至 10 月上旬幼虫老熟即可在豆荚中越冬。当前可喷洒 10%吡虫啉 1500 倍液杀灭转移危害的幼虫，如查到豆荚中有虫应及时剪除，杀灭幼虫。

月季黑斑病

据本周初调查，月季黑斑病在一些地段发生严重，受害叶片多在中下部，有的叶片布满黑色斑块，有的已开始落叶，此期应注意保护尚未受害的叶片减轻危害，可喷洒多菌灵、托布津等杀菌剂防治。

其它应注意防治的病虫

其它应注意防治的病虫有棉大卷叶螟、刺蛾、国槐尺蛾、黄杨绢野螟、含羞草雕蛾、榆绿叶甲、蓑蛾、木虱、斑衣蜡蝉、光肩星天牛、小线角木蠹蛾、六星黑点豹蠹蛾、臭椿沟眶象、黄杨白粉病、日本菟丝子。

九月份防治要点

食叶害虫：美国白蛾，三代发生危害期，此期除仍有一些二代蛹、成虫外，三代卵、初孵幼虫和网幕也同时存在。9 月上旬为三代幼虫孵化盛期，中旬将有部分幼虫破网分散危害，9 月末或 10 月上旬将会有老熟幼虫化蛹，开始越冬。9 月上旬应全面喷洒除虫脲 6000—8000 倍液防治三代低龄幼虫，同时进行人工剪除网幕防治，9 月中下旬视虫情喷洒 1.2%苦烟乳油杀灭分散危害的幼虫和老熟幼虫。9 月份还应注意防治国槐尺蛾、黄刺蛾、双齿绿刺蛾、棉大卷叶螟、黄杨绢野螟、大蓑蛾等。

钻蛀害虫：小线角木蠹蛾，在九月份应继续采用药剂注射和挖治新蛀入幼虫等措施防治。对小线角木蠹蛾危害西府海棠、国槐严重者，也应注意检查防治。应继续药剂注射防治光肩星天牛、云斑天牛，开始剪除进入槐豆荚中的国槐小卷蛾幼虫。亦应注意对六星黑点豹蠹蛾、臭椿沟眶象的防治。

刺吸害虫：蚜虫，9 月份花灌木上蚜虫逐渐增多，将会出现又一个危害高峰期，此期应特别注意月季长管蚜、槐蚜、柳黑毛蚜、栾多态毛蚜、棉蚜、绣线菊蚜、毛白杨蚜等危害，采用 1000 倍 1.2%苦烟乳油或 5%吡虫啉 2000 倍液防治效果较好。其它刺吸害虫还应注意防治叶蝉、梨冠网蝽、法桐方翅网蝽、青桐木虱、合欢木虱、斑衣蜡蝉、蝉产卵枝等。叶螨，9 月份在乔木和花灌木上仍有危害，应继续喷洒药剂防治，争取在其越冬前将其消灭，药剂可选用石硫合剂或阿维菌素。

病害：草坪锈病 9—10 月份发病严重，尤其生长茂密，阳光照射强地块发生居多，应认真检查，可选用 400 倍液晶体石硫合剂或粉锈宁等进行防治。还应注意黄杨、法桐白粉病、月季黑斑病的防治。注意检查有日本菟丝子危害的地段，要清除受害植株、客土，重新栽植、杜绝危害。