

园林病虫信息

第二十六期（总第 555 期）

天津市市容和园林管理委员会
天津市园林绿化研究所植保中心

2017 年 09 月 06 日
植保热线：84268088



美国白蛾

据本周初调查，美国白蛾三代幼虫虫龄大部分为 1-2 龄，也有一些初孵幼虫，幼虫网幕最大有 40cm 左右。当前应抓紧喷洒除虫脲 6000 倍液杀灭初孵幼虫和网幕中的幼虫。同时应组织人力剪除网幕，网幕多处在树冠中下层部分，利于剪除，且三代美国白蛾发生在气温逐渐降低的情况下，其发育速度较缓，有更多的时间可进行剪网幕防治。因此应做好这项防治工作，剪网幕做得好可减少药剂防治，减少环境污染。



美国白蛾三代网幕



槐蚜

棉大卷叶螟

据本周初调查，在大花秋葵、木槿等锦葵科植物上，棉大卷叶螟幼虫仍有危害，虫体大小不一，多为 1cm 大小，卷叶在其中危害，可人工捏杀幼虫，也可喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂 1500 倍液杀灭幼虫。



娇膜肩网蝽

刺蛾

我市发生的主要刺蛾有：黄刺蛾、双齿绿刺蛾、褐边绿刺蛾，多发生在海棠等果树上，当前黄刺蛾和双齿绿刺蛾幼虫已近老熟，即将做茧越冬，其茧结在树体枝杈处，明显可见，可人工剪除，当前可喷洒 1.2%烟参碱乳油 1000 倍液杀灭幼虫防治。



小线角木蠹蛾被害状

槐蚜

据本周初调查，部分地段仍有槐蚜严重危害，结荚的部位有大量虫体危害，当前在我市危害的蚜虫还有：柳黑毛蚜、绣



沟眶象

线菊蚜、棉蚜、紫薇长斑蚜，应注意检查防治，可喷洒吡虫啉或苦参碱。

娇膜肩网蝽

据本周初调查，娇膜肩网蝽在柳树上仍有严重发生和危害，受害叶片失绿变色，严重者造成落叶，该虫主要危害杨、柳，可喷洒 10%吡虫啉 1500 倍液或 1.2%苦参碱 1000 倍液杀灭。

此期还应注意防治法桐方翅网蝽，经历次调查该虫在我市多处发生危害，造成叶片褪色枯黄，极大影响观瞻，应抓紧检查防治，防治用药同上。

小线角木蠹蛾

据本周初调查，小线角木蠹蛾新蛀入幼虫正大量蛀食，并排出细碎木屑状排泄物，此期正是初蛀入幼虫集中危害的阶段，尚未分散和蛀入木质部深层，当前应认真进行人工挖治幼虫或药剂注射杀灭幼虫防治，药剂注射杀灭幼虫应选用 1.2%烟参碱 100 倍液。小线角木蠹蛾除主要危害白蜡树外，危害西府海棠、国槐也很严重，应一并注意检查防治。

光肩星天牛

据本周初调查，光肩星天牛新一代幼虫在柳树上危害较多，发生处点叶明显增多，树体上新刻槽不见，多见其排出的新鲜木屑状排泄物，应抓紧时机注射药剂防治，注射药剂应选用 1.2%烟参碱 100 倍液。

其它应注意防治的病虫害

其它应注意防治的病虫害有国槐尺蛾、黄杨绢野螟、叶螨、木虱、斑衣蜡蝉、云斑天牛、柳干木蠹蛾、国槐小卷蛾、六星黑点豹蠹蛾、沟眶象、白粉病、月季黑斑病、日本菟丝子等。