



第二十七期（总第 556 期）

2017 年09 月13 日

植保热线：84268088



据本周初调查，我市多处地段种植的粉八宝上有玄灰蝶危害，幼虫在叶片中蛀食，将叶肉蚕食只剩上下表皮后干枯，老熟幼虫也在其中化蛹。本次调查查到幼虫危害和在花丛中飞舞的成虫，当前可喷洒 1.2% 烟参碱乳油 1000 倍液杀灭成虫、幼虫。



据近日调查，在柿树上查到蓑蛾危害，蚕食叶片造成孔洞破损，我市常见的蓑蛾有大蓑蛾、小蓑蛾、洋槐蓑蛾等，主要受害植物有法桐、泡桐、白蜡、西府海棠、爬山虎、五叶地锦等。蓑蛾多以幼虫越冬，当前仍在取食危害，可喷洒 1.2% 烟参碱 1000 倍液或 10% 吡虫啉可湿性粉剂 1500 倍液杀灭，对低矮花灌木发生的蓑蛾，也可人工摘除蓑囊，杀灭幼虫。



小线角木蠹蛾被害状

蚜虫

据近日调查，我市仍有几种蚜虫在危害，主要有：棉蚜、柳黑毛蚜、毛白杨蚜、白蜡卷叶绵蚜、绣线菊蚜、菊小长管蚜等，可喷洒 1.2%烟参碱 1000 倍液杀灭。

斑衣蜡蝉

据近日调查，斑衣蜡蝉雌成虫已开始产卵，卵主要产在臭椿、千头椿等植物上，也常产在白蜡、槐、海棠等其周边的树种上。在成虫较集中、数量较多的地段，应喷洒 1.2%烟参碱乳油 1000 倍液杀灭成虫，如查到已产卵，应开始人工刮卵防治。

木虱

据近日调查，在合欢、青桐上仍有木虱危害，该虫将危害到 10 月中下旬。青桐木虱以卵越冬，合欢木虱以成虫越冬，合欢木虱也在 11 月初见到成虫。当前应做好防治，减少越冬数量，减轻翌年危害。药剂防治可喷洒 1.2%烟参碱乳油 1000 倍液或喷洒 10%吡虫啉 1500 倍液杀灭。

日本龟蜡蚧

据近日调查，日本龟蜡蚧若虫开始从叶片等处向枝条转移，固着危害，当前可喷洒蚧螨灵 80-100 倍液杀灭转移危害的若虫，发生数量较大的植株可人工剪除有虫枝叶防治。该虫多发生在黄杨、白蜡、枣等多种植物上，应注意检查防治。

小线角木蠹蛾

据本周初调查，个别地段白蜡树受小线角木蠹蛾危害较重，今年初蛀入的低龄幼虫和以往的大龄幼虫均大量取食，排出大量排泄物，挂在树体上或洒落在树根基周围地面上，各养管单位应抓紧时间检查，及时进行药剂注射防治。

其它应注意防治的病虫

其它应注意防治的病虫有国槐尺蛾、榆绿叶甲、棉大卷叶螟、柿绒蚧、卫矛矢尖盾蚧、叶螨、葡萄斑叶蝉、小绿叶蝉、二星叶蝉、光肩星天牛、云斑天牛、臭椿沟眶象、国槐小卷蛾（剪有虫豆荚）、白粉病等。