

园林病虫害信息

第三十期（总第 559 期）

天津市市容和园林管理委员会
天津市园林绿化研究所植保中心

2017 年 10 月 18 日
植保热线：84268088



美国白蛾

据近期调查，三代美国白蛾幼虫均已老熟，进入化蛹阶段，多处检查未见幼虫危害。当前应开展人工挖蛹防治工作，尤其是在三代美国白蛾曾发生危害的地段，一定要进行挖蛹防治，以减轻来年发生数量及危害。



柑橘凤蝶幼虫

柑橘凤蝶

据近日调查，柑橘凤蝶（花椒凤蝶）幼虫仍在食叶危害，虫体已近老熟，即将化蛹，该虫以蛹越冬，此期可开始人工捕杀和摘除树体上越冬蛹防治。



桃粉蚜

蚜虫

据本次调查，我市仍有柳黑毛蚜、杨花毛蚜、桃粉蚜等几种危害，有的蚜虫开始产卵越冬，当前应在每天气温较高时段喷洒 1.2% 烟参碱乳油 1000 倍液杀灭成蚜、若蚜，以减少危害和产卵数量。



山楂叶螨成螨

小绿叶蝉

据本周初调查，在碧桃等花灌木上仍有小绿叶蝉危害，成虫、若虫均在叶片背面取食危害，应及时喷洒 1.2% 烟参碱乳油 1000 倍液或 10% 吡虫啉可湿性粉剂 2000 倍液杀灭。



紫薇绒蚧

斑衣蜡蝉

据本周初调查，斑衣蜡蝉雌成虫仍在继续产卵块，初产卵块灰白色，不久呈土黄色。当前除喷洒药剂杀灭成虫外，



紫薇绒蚧

应发动人工进行铲除卵块防治。

山楂叶螨

据本次调查，在山楂上仍可见到山楂叶螨危害，多为成螨，该螨以受精雌成螨越冬，越冬场所在树体翘皮、伤疤等处，亦可在树根际周围杂草土块下越冬。当前应喷洒晶体石硫合剂 100 倍液杀灭，喷洒时注意喷洒树干、大枝和根茎周围土面。

合欢木虱

据本周初调查，合欢上仍有合欢木虱若虫和成虫栖息危害，该虫以成虫越冬，成虫可危害至 11 月上旬，此期应喷洒 10%吡虫啉可湿性粉剂或 1.2%烟参碱乳油 1000 倍液，杀灭成、若虫，以减少越冬数量和翌年危害。

紫薇绒蚧

据本次调查，紫薇绒蚧若虫数量较大，该虫以若虫在树体上越冬。当前应喷洒 1.2%烟参碱乳油 1000 倍液杀灭若虫，还应人工刮除树干上的虫体，以减少越冬基数。该虫主要危害紫薇、石榴，注意一并检查防治。

小线角木蠹蛾

据本周调查，小线角木蠹蛾幼虫未进入休眠越冬，仍在继续危害。此期应抓紧时间进行冬前防治，注射 100 倍液 1.2%烟参碱乳油，杀灭幼虫。对受害严重枝条应予以剪除，对受害严重且无保留价值的树木应予以刨除。

其它应注意防治的病虫

其它应注意防治的病虫有桃粉蚜、桑始叶螨、梨冠网蝽、法桐方翅网蝽、光肩星天牛、国槐小卷蛾、黄杨白粉病等。